

広島県西部保健所管内(大竹市・廿日市市)のインフルエンザの流行状況について


広島県西部保健所

広島県西部保健所管内(大竹市・廿日市市)の定点医療機関等におけるインフルエンザ患者数等の状況は、次のとおりです。
(令和8年第24週)

インフルエンザ定点医療機関において1週間に診断された患者数です。

(人)

期 間	西部保健所(大竹市・廿日市市)		広島県		全国	
	患者数	定点当たり	患者数	定点当たり	患者数	定点当たり
令和8年第24週(6/8~6/14)	0	0.00	0	0.00	272	0.07
令和8年第23週(6/1~6/7)	0	0.00	0	0.00	239	0.06
令和8年第22週(5/25~5/31)	0	0.00	2	0.02	261	0.07
令和8年第21週(5/18~5/24)	0	0.00	2	0.02	346	0.09



※ 感染症発生動向調査に基づいて作成したものです。

○ インフルエンザの感染経路

【飛沫感染】 感染者の咳やくしゃみの「しぶき」を吸い込むなど

【接触感染】 汚染されたドアノブや机などに手が触れ、その手で口、鼻などに触れるなど

○ 感染拡大防止のための注意点

《 流水と石けんでこまめに手洗いをしましょう。》

外から帰ってきた時など、こまめに流水と石けんで手洗いを励行しましょう。

《 咳エチケットを守りましょう。》

咳やくしゃみの症状がある方は、咳エチケットを守りましょう。

《 予防接種を受けましょう。》

流行前に予防接種を受けましょう。ウイルスが侵入してきても、予防接種をしていれ

☆ 症状などからインフルエンザが疑われる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

☆ 厚生労働省が、「急性呼吸器感染症(ARI)総合対策に関するQ&A(インフルエンザを含む)」を作成していますので、参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/QA2025.html