




令和8年度 フェロモントラップ等調査結果

クビアカスカシバ (フェロモン)

1 トラップ調査結果

(1) グラフ



(2)調査データ

地帯区分		中東部			中東部			中東部		
設置場所		神石高原町(油木地区)			世羅町(安田地区)			三次市東酒屋町		
周辺作物		ぶどう			ぶどう			ぶどう		
月	半旬	本年	平均 (7年)	前年	本年	平均	前年	本年	平均	前年
5月	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0
	5	0	0	0	0	0.1	0	0	0.2	0
	6	0	0	0	0	0.1	0	0	1.0	0
6月	1	0	0.1	0	FALSE	0.5	0	0	0.6	0
	2	10.3	1.2	3.1	0.5	0.6	0	0	2.8	0
	3	15.6	3.9	7.9	3.5	1.5	2.0	9.0	2.0	0
	4	9.3	6.1	9.3	3.5	2.0	2.0	5.0	4.2	9.0
	5		8.5	16.6		2.2	2.5		9.6	8.0
	6		9.0	22.1		3.2	2.5		3.9	12.0
7月	1		13.1	25.0		2.3	2.5		5.9	15.0
	2		16.7	31.9		2.5	2.5		6.2	9.0
	3		14.0	30.1		2.5	1.0		8.0	5.0
	4		11.6	25.0		2.3	1.0		9.1	8.0
	5		10.5	20.0		1.6	2.3		5.2	9.0
	6		11.4	25.1		1.5	2.7		6.9	4.0
8月	1		8.5	21.4		2.8	0.5		4.0	4.0
	2		6.1	21.4		3.3	0.5		3.2	4.0
	3		3.9	11.4		1.7	3.0		2.4	3.0
	4		1.8	7.1		0.9	3.0		0.3	0
	5		0.9	3.4		0.3	0		0.6	0
	6		0.5	0		0.2	0		0	0
9月	1		0.1	0		0	0		0	0
	2		0	0		0	0		0	0
	3		0	0		0	0		0	0
	4		0	0		0	0		0	0
	5		0	0		0	0		0	0
	6		0	0		0	0		0	0
		35.1	127.9	281.0	7.5	32.2	28.0	14.0	76.6	90.0