

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号 | 発見月日    | 発見場所  | 性別  | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|----|---------|-------|-----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1  | R3.6.29 | 尾道市   | 雌   | 捕獲 | 成獣 | 80         | 35         | R3.7.1  | 陰性 |
| 2  | R3.7.5  | 三原市   | 雄   | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40         | R3.7.8  | 陰性 |
| 3  | R3.7.5  | 三原市   | 雌   | 捕獲 | 成獣 | 80         | 20         | R3.7.8  | 陰性 |
| 4  | R3.7.5  | 三原市   | 雄   | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 3          | R3.7.8  | 陰性 |
| 5  | R3.7.5  | 三原市   | 雄   | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 10         | R3.7.8  | 陰性 |
| 6  | R3.7.5  | 三原市   | 未確認 | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5          | R3.7.8  | 陰性 |
| 7  | R3.7.5  | 三原市   | 未確認 | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5          | R3.7.8  | 陰性 |
| 8  | R3.7.5  | 三原市   | 未確認 | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5          | R3.7.8  | 陰性 |
| 9  | R3.7.5  | 福山市   | 雌   | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 3          | R3.7.8  | 陰性 |
| 10 | R3.7.6  | 三原市   | 雄   | 捕獲 | 成獣 | 85         | 25         | R3.7.9  | 陰性 |
| 11 | R3.7.6  | 三原市   | 雄   | 捕獲 | 成獣 | 85         | 25         | R3.7.9  | 陰性 |
| 12 | R3.7.7  | 神石高原町 | 雄   | 捕獲 | 成獣 | 120        | 35         | R3.7.14 | 陰性 |
| 13 | R3.7.7  | 三原市   | 雄   | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 4          | R3.7.14 | 陰性 |
| 14 | R3.7.7  | 三原市   | 雌   | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 4          | R3.7.14 | 陰性 |
| 15 | R3.7.7  | 三原市   | 雄   | 捕獲 | 幼獣 | 45         | 2          | R3.7.14 | 陰性 |
| 16 | R3.7.7  | 三原市   | 雄   | 捕獲 | 成獣 | 90         | 20         | R3.7.14 | 陰性 |
| 17 | R3.7.7  | 三原市   | 雄   | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 6          | R3.7.14 | 陰性 |
| 18 | R3.7.7  | 三原市   | 雌   | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 5          | R3.7.14 | 陰性 |
| 19 | R3.7.7  | 三原市   | 雌   | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 5          | R3.7.14 | 陰性 |
| 20 | R3.7.7  | 三原市   | 雄   | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 6          | R3.7.14 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号 | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 21 | R3.7.7  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 6          | R3.7.14 | 陰性 |
| 22 | R3.7.12 | 神石高原町 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 3          | R3.7.16 | 陰性 |
| 23 | R3.7.12 | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 3          | R3.7.16 | 陰性 |
| 24 | R3.7.15 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 2          | R3.7.21 | 陰性 |
| 25 | R3.7.15 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 3          | R3.7.21 | 陰性 |
| 26 | R3.7.19 | 神石高原町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 50         | R3.7.27 | 陰性 |
| 27 | R3.7.20 | 庄原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 45         | R3.7.28 | 陰性 |
| 28 | R3.7.21 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 95         | 60         | R3.7.28 | 陰性 |
| 29 | R3.7.21 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 8          | R3.7.28 | 陰性 |
| 30 | R3.7.21 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 10         | R3.7.28 | 陰性 |
| 31 | R3.7.21 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 10         | R3.7.28 | 陰性 |
| 32 | R3.7.21 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 10         | R3.7.28 | 陰性 |
| 33 | R3.7.21 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 10         | R3.7.28 | 陰性 |
| 34 | R3.7.27 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 35.0       | R3.8.2  | 陰性 |
| 35 | R3.7.27 | 神石高原町 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 7.0        | R3.8.2  | 陰性 |
| 36 | R3.7.27 | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 7.0        | R3.8.2  | 陰性 |
| 37 | R3.7.27 | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 65.0       | R3.8.2  | 陰性 |
| 38 | R3.7.28 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 15.0       | R3.8.2  | 陰性 |
| 39 | R3.7.28 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 60.0       | R3.8.2  | 陰性 |
| 40 | R3.7.28 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 85         | 40.0       | R3.8.2  | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号 | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 41 | R3.8.2  | 神石高原町 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 65         | 5.5        | R3.8.5  | 陰性 |
| 42 | R3.8.2  | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 65         | 5.5        | R3.8.5  | 陰性 |
| 43 | R3.8.2  | 神石高原町 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5.0        | R3.8.5  | 陰性 |
| 44 | R3.8.2  | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5.0        | R3.8.6  | 陰性 |
| 45 | R3.8.2  | 三次市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 25.0       | R3.8.5  | 陰性 |
| 46 | R3.8.2  | 三次市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 25.0       | R3.8.5  | 陰性 |
| 47 | R3.8.4  | 三次市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5.0        | R3.8.11 | 陰性 |
| 48 | R3.8.4  | 三次市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5.0        | R3.8.11 | 陰性 |
| 49 | R3.8.4  | 三次市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5.0        | R3.8.11 | 陰性 |
| 50 | R3.8.10 | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5.0        | R3.8.19 | 陰性 |
| 51 | R3.8.10 | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5.0        | R3.8.20 | 陰性 |
| 52 | R3.8.10 | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5.0        | R3.8.19 | 陰性 |
| 53 | R3.8.10 | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5.0        | R3.8.19 | 陰性 |
| 54 | R3.8.10 | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5.0        | R3.8.19 | 陰性 |
| 55 | R3.8.10 | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 70.0       | R3.8.19 | 陰性 |
| 56 | R3.8.11 | 庄原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 4.0        | R3.8.19 | 陰性 |
| 57 | R3.8.11 | 庄原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 4.0        | R3.8.19 | 陰性 |
| 58 | R3.8.11 | 庄原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 4.0        | R3.8.19 | 陰性 |
| 59 | R3.8.12 | 三次市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 45         | 2.0        | R3.8.24 | 陰性 |
| 60 | R3.8.23 | 三次市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 80.0       | R3.8.26 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号 | 発見月日    | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|----|---------|------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 61 | R3.8.23 | 三次市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 75         | 50.0       | R3.8.26 | 陰性 |
| 62 | R3.8.23 | 三次市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 75         | 45.0       | R3.8.26 | 陰性 |
| 63 | R3.8.23 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 30.0       | R3.8.26 | 陰性 |
| 64 | R3.8.23 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 7.0        | R3.9.3  | 陰性 |
| 65 | R3.8.24 | 三次市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 70.0       | R3.9.3  | 陰性 |
| 66 | R3.8.26 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 4.0        | R3.9.3  | 陰性 |
| 67 | R3.8.27 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 7.0        | R3.9.3  | 陰性 |
| 68 | R3.8.27 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 50.0       | R3.9.3  | 陰性 |
| 69 | R3.8.27 | 広島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 85         | 18.0       | R3.9.3  | 陰性 |
| 70 | R3.8.27 | 広島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 90         | 20.0       | R3.9.3  | 陰性 |
| 71 | R3.8.30 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 60.0       | R3.9.3  | 陰性 |
| 72 | R3.8.30 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 95         | 45.0       | R3.9.3  | 陰性 |
| 73 | R3.8.30 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 45.0       | R3.9.4  | 陰性 |
| 74 | R3.9.1  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 7.0        | R3.9.21 | 陰性 |
| 75 | R3.9.1  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5.0        | R3.9.21 | 陰性 |
| 76 | R3.9.6  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40.0       | R3.9.21 | 陰性 |
| 77 | R3.9.6  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40.0       | R3.9.21 | 陰性 |
| 78 | R3.9.6  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 4.0        | R3.9.21 | 陰性 |
| 79 | R3.9.6  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 40.0       | R3.9.21 | 陰性 |
| 80 | R3.9.10 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5.0        | R3.9.21 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日     | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日     | 結果 |
|-----|----------|-------|----|----|----|------------|------------|----------|----|
| 81  | R3.9.10  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5.0        | R3.9.21  | 陰性 |
| 82  | R3.9.10  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5.0        | R3.9.21  | 陰性 |
| 83  | R3.9.15  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 65         | 8.0        | R3.9.21  | 陰性 |
| 84  | R3.9.16  | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 20.0       | R3.10.11 | 陰性 |
| 85  | R3.10.4  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 10.0       | R3.10.11 | 陰性 |
| 86  | R3.10.4  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 50.0       | R3.10.11 | 陰性 |
| 87  | R3.10.5  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 95         | 30.0       | R3.10.11 | 陰性 |
| 88  | R3.10.7  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 60.0       | R3.10.25 | 陰性 |
| 89  | R3.10.11 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60.0       | R3.10.25 | 陰性 |
| 90  | R3.10.13 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 15.0       | R3.10.25 | 陰性 |
| 91  | R3.10.13 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 15.0       | R3.10.25 | 陰性 |
| 92  | R3.10.19 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40.0       | R3.10.25 | 陰性 |
| 93  | R3.10.20 | 三次市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 55.0       | R3.11.5  | 陰性 |
| 94  | R3.10.22 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60.0       | R3.11.5  | 陰性 |
| 95  | R3.10.22 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 75         | 10.0       | R3.11.5  | 陰性 |
| 96  | R3.11.1  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 20         | R3.11.5  | 陰性 |
| 97  | R3.11.1  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 20         | R3.11.5  | 陰性 |
| 98  | R3.11.1  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40         | R3.11.5  | 陰性 |
| 99  | R3.11.1  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40         | R3.11.5  | 陰性 |
| 100 | R3.11.2  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40         | R3.11.5  | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日     | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日     | 結果 |
|-----|----------|-------|----|----|----|------------|------------|----------|----|
| 101 | R3.11.4  | 神石高原町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 25         | R3.11.22 | 陰性 |
| 102 | R3.11.4  | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 75         | 30         | R3.11.22 | 陰性 |
| 103 | R3.11.4  | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 75         | 30         | R3.11.22 | 陰性 |
| 104 | R3.11.5  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 15         | R3.11.22 | 陰性 |
| 105 | R3.11.5  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 140        | 100        | R3.11.22 | 陰性 |
| 106 | R3.11.8  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 15         | R3.11.22 | 陰性 |
| 107 | R3.11.18 | 三原市   | 不明 | 死亡 | 成獣 | 60         | 15.0       | R3.11.22 | 陰性 |
| 108 | R3.11.26 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 80         | R3.12.3  | 陰性 |
| 109 | R3.12.7  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 140        | 95         | R3.12.20 | 陰性 |
| 110 | R3.12.9  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 80         | 20         | R3.12.20 | 陰性 |
| 111 | R3.12.9  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 80         | 20         | R3.12.20 | 陰性 |
| 112 | R3.12.9  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 80         | R3.12.20 | 陰性 |
| 113 | R3.12.13 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 15         | R3.12.20 | 陰性 |
| 114 | R3.12.13 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 15         | R3.12.20 | 陰性 |
| 115 | R3.12.13 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 15         | R3.12.20 | 陰性 |
| 116 | R3.12.14 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 70         | R3.12.20 | 陰性 |
| 117 | R3.12.17 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 40         | R4.1.6   | 陰性 |
| 118 | R3.12.17 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 30         | R4.1.6   | 陰性 |
| 119 | R4.1.14  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60         | R4.1.21  | 陰性 |
| 120 | R4.1.16  | 福山市   | 雄  | 死亡 | 成獣 | 120        | 80.0       | R4.1.18  | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日                          | 結果 |
|-----|---------|------|----|----|----|------------|------------|-------------------------------|----|
| 121 | R4.2.2  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 140        | 60         | R4.2.22                       | 陰性 |
| 122 | R4.2.3  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 140        | 70         | R4.2.22                       | 陰性 |
| 123 | R4.2.10 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 15         | R4.2.22                       | 陰性 |
| 124 | R4.2.18 | 尾道市  | 雌  | 死亡 | 成獣 | 100        | 80.0       | R4.1.18                       | 陰性 |
| 125 | R4.2.22 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60         | R4.3.4                        | 陰性 |
| 126 | R4.2.24 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 30         | R4.3.4                        | 陰性 |
| 127 | R4.2.28 | 廿日市市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 80         | R4.3.4                        | 陰性 |
| 128 | R4.2.28 | 廿日市市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 20         | R4.3.4                        | 陰性 |
| 129 | R4.2.28 | 廿日市市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 75         | 15         | R4.3.4                        | 陰性 |
| 130 | R4.2.28 | 廿日市市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 18         | R4.3.4                        | 陰性 |
| 131 | R4.3.2  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 15         | R4.3.17                       | 陰性 |
| 132 | R4.3.7  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 25         | R4.3.17                       | 陰性 |
| 133 | R4.3.7  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 85         | 20         | R4.3.17                       | 陰性 |
| 134 | R4.3.7  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 115        | 55         | R4.3.17                       | 陰性 |
| 135 | R4.3.22 | 庄原市  | 雄  | 死亡 | 幼獣 | 60         | 7.0        | R4.3.23                       | 陰性 |
| 136 | R4.3.17 | 大竹市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 70.0       | R4.3.20<br>(確定検査<br>:R4.3.21) | 陽性 |
| 137 | R4.3.22 | 大竹市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 20.0       | R4.3.22                       | 陰性 |
| 138 | R4.3.22 | 大竹市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 40         | 8.0        | R4.3.22                       | 陰性 |
| 139 | R4.3.23 | 呉市   | 不明 | 死亡 | 幼獣 | 45         | 15.0       | R4.3.23                       | 陰性 |
| 140 | R4.3.24 | 呉市   | 雄  | 死亡 | 幼獣 | 70         | 10.0       | R4.3.24                       | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 141 | R4.3.24 | 庄原市   | 不明 | 死亡 | 幼獣 | 70         | 6.0        | R4.3.25 | 陰性 |
| 142 | R4.3.25 | 大竹市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 15.0       | R4.3.25 | 陰性 |
| 143 | R4.3.25 | 大竹市   | 雄  | 死亡 | 成獣 | 80         | 15.0       | R4.3.25 | 陰性 |
| 144 | R4.3.25 | 大竹市   | 雌  | 死亡 | 成獣 | 80         | 15.0       | R4.3.25 | 陰性 |
| 145 | R4.3.25 | 大竹市   | 雄  | 死亡 | 成獣 | 80         | 15.0       | R4.3.25 | 陰性 |
| 146 | R4.3.24 | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 100        | R4.3.29 | 陰性 |
| 147 | R4.3.24 | 安芸太田町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 30         | R4.3.29 | 陰性 |
| 148 | R4.3.31 | 呉市    | 雌  | 死亡 | 成獣 | 80         | 30         | R4.4.1  | 陰性 |
| 149 | R4.4.1  | 大竹市   | 雌  | 死亡 | 成獣 | 100        | 60         | R4.4.5  | 陽性 |
| 150 | R4.4.1  | 府中市   | 雌  | 死亡 | 成獣 | 80         | 20         | R4.4.5  | 陰性 |
| 151 | R4.4.5  | 三原市   | 雌  | 死亡 | 成獣 | 70         | 16         | R4.4.8  | 陰性 |
| 152 | R4.4.7  | 大竹市   | 雄  | 死亡 | 成獣 | 120        | 50         | R4.4.12 | 陰性 |
| 153 | R4.4.7  | 府中市   | 雄  | 死亡 | 幼獣 | 50         | 7          | R4.4.12 | 陰性 |
| 154 | R4.4.11 | 三原市   | 雄  | 死亡 | 幼獣 | 60         | 10         | R4.4.15 | 陰性 |
| 155 | R4.4.11 | 廿日市市  | 雌  | 死亡 | 成獣 | 100        | 45         | R4.4.15 | 陽性 |
| 156 | R4.4.18 | 北広島町  | 雌  | 死亡 | 成獣 | 70         | 7          | R4.4.22 | 陰性 |
| 157 | R4.4.18 | 北広島町  | 雄  | 死亡 | 成獣 | 80         | 10         | R4.4.22 | 陰性 |
| 158 | R4.4.18 | 北広島町  | 雌  | 死亡 | 成獣 | 95         | 16         | R4.4.22 | 陰性 |
| 159 | R4.4.18 | 大竹市   | 雄  | 死亡 | 成獣 | 120        | 30         | R4.4.22 | 陽性 |
| 160 | R4.4.20 | 東広島市  | 雌  | 死亡 | 幼獣 | 65         | 15         | R4.4.26 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 161 | R4.4.28 | 庄原市   | 雄  | 死亡 | 成獣 | 80         | 20         | R4.5.10 | 陰性 |
| 162 | R4.5.8  | 福山市   | 雌  | 死亡 | 成獣 | 130        | 60         | R4.5.13 | 陰性 |
| 163 | R4.5.15 | 大竹市   | 雄  | 死亡 | 幼獣 | 50         | 8          | R4.5.20 | 陽性 |
| 164 | R4.5.23 | 府中市   | 雌  | 死亡 | 成獣 | 80         | 30         | R4.5.26 | 陰性 |
| 165 | R4.5.29 | 広島市   | 雄  | 死亡 | 幼獣 | 40         | 3          | R4.6.3  | 陰性 |
| 166 | R4.6.17 | 坂町    | 雌  | 死亡 | 幼獣 | 40         | 3          | R4.6.24 | 陰性 |
| 167 | R4.7.6  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 1          | R4.7.15 | 陰性 |
| 168 | R4.7.6  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 1          | R4.7.15 | 陰性 |
| 169 | R4.7.7  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 2          | R4.7.15 | 陰性 |
| 170 | R4.7.7  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 2          | R4.7.15 | 陰性 |
| 171 | R4.7.7  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 2          | R4.7.15 | 陰性 |
| 172 | R4.7.7  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 2          | R4.7.15 | 陰性 |
| 173 | R4.7.10 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 6          | R4.7.15 | 陰性 |
| 174 | R4.7.10 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 8.0        | R4.7.15 | 陰性 |
| 175 | R4.7.10 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 8.0        | R4.7.15 | 陰性 |
| 176 | R4.7.7  | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 65         | 10         | R4.7.15 | 陰性 |
| 177 | R4.7.8  | 安芸高田市 | 不明 | 捕獲 | 成獣 | 120        | 32         | R4.7.15 | 陰性 |
| 178 | R4.7.8  | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 65         | 35         | R4.7.15 | 陰性 |
| 179 | R4.7.8  | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 75         | 25         | R4.7.15 | 陰性 |
| 180 | R4.7.10 | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 4          | R4.7.15 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 181 | R4.7.12 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 3          | R4.7.15 | 陰性 |
| 182 | R4.7.12 | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 3          | R4.7.15 | 陰性 |
| 183 | R4.7.12 | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60         | R4.7.15 | 陰性 |
| 184 | R4.7.12 | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 80         | 20         | R4.7.15 | 陰性 |
| 185 | R4.7.13 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60         | R4.7.20 | 陰性 |
| 186 | R4.7.13 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 10         | R4.7.20 | 陰性 |
| 187 | R4.7.13 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 9          | R4.7.20 | 陰性 |
| 188 | R4.7.13 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 10         | R4.7.20 | 陰性 |
| 189 | R4.7.13 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60         | R4.7.20 | 陰性 |
| 190 | R4.7.11 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 72         | 18         | R4.7.20 | 陰性 |
| 191 | R4.7.11 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 72         | 17         | R4.7.20 | 陰性 |
| 192 | R4.7.11 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 65         | 13         | R4.7.20 | 陰性 |
| 193 | R4.7.11 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 13         | R4.7.20 | 陰性 |
| 194 | R4.7.11 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 12         | R4.7.20 | 陰性 |
| 195 | R4.7.12 | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 30         | R4.7.20 | 陰性 |
| 196 | R4.7.12 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 90         | 30         | R4.7.20 | 陰性 |
| 197 | R4.7.5  | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 80         | R4.7.20 | 陰性 |
| 198 | R4.7.9  | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 106        | 67         | R4.7.20 | 陰性 |
| 199 | R4.7.10 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 5          | R4.7.20 | 陰性 |
| 200 | R4.7.11 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 65         | R4.7.20 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 201 | R4.7.14 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 123        | 80         | R4.7.20 | 陰性 |
| 202 | R4.7.14 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 48         | 2          | R4.7.20 | 陰性 |
| 203 | R4.7.14 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 52         | 2          | R4.7.20 | 陰性 |
| 204 | R4.7.14 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 2          | R4.7.20 | 陰性 |
| 205 | R4.7.14 | 尾道市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 50         | R4.7.22 | 陰性 |
| 206 | R4.7.7  | 大崎上島町 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 80         | 15         | R4.7.22 | 陰性 |
| 207 | R4.7.11 | 大崎上島町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 不明         | 60         | R4.7.22 | 陰性 |
| 208 | R4.7.12 | 大崎上島町 | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 2          | R4.7.22 | 陰性 |
| 209 | R4.7.13 | 大崎上島町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 50         | R4.7.22 | 陰性 |
| 210 | R4.7.17 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 不明         | 50         | R4.7.22 | 陰性 |
| 211 | R4.7.17 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 43         | 2          | R4.7.22 | 陰性 |
| 212 | R4.7.17 | 竹原市   | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 43         | 2          | R4.7.22 | 陰性 |
| 213 | R4.7.17 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 43         | 2          | R4.7.22 | 陰性 |
| 214 | R4.7.17 | 竹原市   | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 52         | 3          | R4.7.22 | 陰性 |
| 215 | R4.7.16 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 78         | 25         | R4.7.26 | 陰性 |
| 216 | R4.7.16 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 72         | 20         | R4.7.26 | 陰性 |
| 217 | R4.7.18 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 30         | R4.7.26 | 陰性 |
| 218 | R4.7.18 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 7          | R4.7.26 | 陰性 |
| 219 | R4.7.20 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 12         | R4.7.26 | 陰性 |
| 220 | R4.7.20 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 57         | 10         | R4.7.26 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 221 | R4.7.19 | 広島市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 70         | R4.7.26 | 陰性 |
| 222 | R4.7.16 | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 35         | R4.7.26 | 陰性 |
| 223 | R4.7.20 | 安芸高田市 | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 6          | R4.7.26 | 陰性 |
| 224 | R4.7.20 | 安芸高田市 | 不明 | 捕獲 | 成獣 | 90         | 30         | R4.7.26 | 陰性 |
| 225 | R4.7.21 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40         | R4.7.29 | 陰性 |
| 226 | R4.7.21 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40         | R4.7.29 | 陰性 |
| 227 | R4.7.21 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 7          | R4.7.29 | 陰性 |
| 228 | R4.7.21 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 7          | R4.7.29 | 陰性 |
| 229 | R4.7.21 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 7          | R4.7.29 | 陰性 |
| 230 | R4.7.23 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 6          | R4.7.29 | 陰性 |
| 231 | R4.7.23 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60         | R4.7.29 | 陰性 |
| 232 | R4.7.15 | 大崎上島町 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 10         | R4.7.29 | 陰性 |
| 233 | R4.7.15 | 大崎上島町 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 25         | 2          | R4.7.29 | 陰性 |
| 234 | R4.7.20 | 大崎上島町 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 25         | 2          | R4.7.29 | 陰性 |
| 235 | R4.7.22 | 大崎上島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60         | R4.7.29 | 陰性 |
| 236 | R4.7.23 | 大崎上島町 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 25         | 3          | R4.7.29 | 陰性 |
| 237 | R4.7.23 | 大崎上島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 35         | R4.7.29 | 陰性 |
| 238 | R4.7.23 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 8          | R4.8.2  | 陰性 |
| 239 | R4.7.24 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 40         | R4.8.2  | 陰性 |
| 240 | R4.7.25 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 40         | R4.8.2  | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日   | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|--------|----|
| 241 | R4.7.25 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 7          | R4.8.2 | 陰性 |
| 242 | R4.7.25 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 7          | R4.8.2 | 陰性 |
| 243 | R4.7.25 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 1          | R4.8.2 | 陰性 |
| 244 | R4.7.25 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 8          | R4.8.2 | 陰性 |
| 245 | R4.7.25 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 8          | R4.8.2 | 陰性 |
| 246 | R4.7.25 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 8          | R4.8.2 | 陰性 |
| 247 | R4.7.25 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 7          | R4.8.2 | 陰性 |
| 248 | R4.7.25 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 7          | R4.8.2 | 陰性 |
| 249 | R4.7.26 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 50         | R4.8.2 | 陰性 |
| 250 | R4.7.26 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 25         | R4.8.2 | 陰性 |
| 251 | R4.7.26 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 25         | R4.8.2 | 陰性 |
| 252 | R4.7.27 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 1          | R4.8.2 | 陰性 |
| 253 | R4.7.24 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 100        | R4.8.2 | 陰性 |
| 254 | R4.7.24 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 85         | 12         | R4.8.2 | 陰性 |
| 255 | R4.7.24 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 2          | R4.8.2 | 陰性 |
| 256 | R4.7.25 | 竹原市   | 不明 | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40         | R4.8.2 | 陰性 |
| 257 | R4.7.25 | 竹原市   | 不明 | 捕獲 | 成獣 | 110        | 130        | R4.8.2 | 陰性 |
| 258 | R4.7.27 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40         | R4.8.2 | 陰性 |
| 259 | R4.7.25 | 安芸太田町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 35         | R4.8.2 | 陰性 |
| 260 | R4.7.28 | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 80         | 30         | R4.8.2 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日   | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|--------|----|
| 261 | R4.7.28 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 58         | 2.5        | R4.8.5 | 陰性 |
| 262 | R4.7.28 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 1.5        | R4.8.5 | 陰性 |
| 263 | R4.7.28 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 1.5        | R4.8.5 | 陰性 |
| 264 | R4.7.30 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 48         | 4          | R4.8.5 | 陰性 |
| 265 | R4.7.30 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 5          | R4.8.5 | 陰性 |
| 266 | R4.7.21 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5          | R4.8.5 | 陰性 |
| 267 | R4.7.21 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 45         | 4          | R4.8.5 | 陰性 |
| 268 | R4.7.23 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 35         | R4.8.5 | 陰性 |
| 269 | R4.7.27 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40         | R4.8.5 | 陰性 |
| 270 | R4.7.28 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 50         | R4.8.5 | 陰性 |
| 271 | R4.7.30 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 6          | R4.8.5 | 陰性 |
| 272 | R4.8.1  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 75         | 18         | R4.8.9 | 陰性 |
| 273 | R4.7.30 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 15         | R4.8.5 | 陰性 |
| 274 | R4.8.3  | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 30         | R4.8.9 | 陰性 |
| 275 | R4.8.3  | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 45         | 5          | R4.8.9 | 陰性 |
| 276 | R4.8.3  | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 28         | R4.8.9 | 陰性 |
| 277 | R4.7.28 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 8          | R4.8.9 | 陰性 |
| 278 | R4.7.28 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 35         | R4.8.9 | 陰性 |
| 279 | R4.7.31 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 70         | R4.8.9 | 陰性 |
| 280 | R4.8.1  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 30         | R4.8.9 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 281 | R4.8.1  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 15         | R4.8.9  | 陰性 |
| 282 | R4.7.31 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 7          | R4.8.9  | 陰性 |
| 283 | R4.7.31 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 35         | R4.8.9  | 陰性 |
| 284 | R4.8.1  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 40         | R4.8.9  | 陰性 |
| 285 | R4.8.2  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 100        | 1.2        | R4.8.9  | 陰性 |
| 286 | R4.8.2  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 80         | 1          | R4.8.9  | 陰性 |
| 287 | R4.8.2  | 竹原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 60         | R4.8.12 | 陰性 |
| 288 | R4.8.3  | 竹原市  | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 不明         | 不明         | R4.8.12 | 陰性 |
| 289 | R4.8.4  | 竹原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 100        | R4.8.12 | 陰性 |
| 290 | R4.8.4  | 竹原市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 20         | R4.8.12 | 陰性 |
| 291 | R4.8.6  | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 140        | 40         | R4.8.12 | 陰性 |
| 292 | R4.8.6  | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 5          | R4.8.12 | 陰性 |
| 293 | R4.8.3  | 坂町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 45         | R4.8.12 | 陰性 |
| 294 | R4.8.5  | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 30         | R4.8.12 | 陰性 |
| 295 | R4.8.5  | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 15         | R4.8.12 | 陰性 |
| 296 | R4.8.6  | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 15         | R4.8.12 | 陰性 |
| 297 | R4.8.3  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 0.8        | R4.8.16 | 陰性 |
| 298 | R4.8.3  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 70         | R4.8.16 | 陰性 |
| 299 | R4.8.5  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 75         | 30         | R4.8.16 | 陰性 |
| 300 | R4.8.5  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 80         | R4.8.16 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 301 | R4.8.5  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 8          | R4.8.16 | 陰性 |
| 302 | R4.8.7  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 20         | R4.8.16 | 陰性 |
| 303 | R4.8.7  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 45         | 5          | R4.8.16 | 陰性 |
| 304 | R4.8.8  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 50         | R4.8.16 | 陰性 |
| 305 | R4.8.9  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 45         | R4.8.16 | 陰性 |
| 306 | R4.8.9  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 75         | 18         | R4.8.16 | 陰性 |
| 307 | R4.8.9  | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 30         | R4.8.19 | 陰性 |
| 308 | R4.8.10 | 庄原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 115        | 63         | R4.8.19 | 陰性 |
| 309 | R4.8.10 | 庄原市   | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 2          | R4.8.19 | 陰性 |
| 310 | R4.8.10 | 庄原市   | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 2          | R4.8.19 | 陰性 |
| 311 | R4.8.10 | 庄原市   | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 2          | R4.8.19 | 陰性 |
| 312 | R4.8.9  | 安芸高田市 | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 8          | R4.8.19 | 陰性 |
| 313 | R4.8.11 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R4.8.19 | 陰性 |
| 314 | R4.8.11 | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 3          | R4.8.19 | 陰性 |
| 315 | R4.8.10 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 80         | 20         | R4.8.19 | 陰性 |
| 316 | R4.8.12 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 9          | R4.8.19 | 陰性 |
| 317 | R4.8.12 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 50         | R4.8.19 | 陰性 |
| 318 | R4.8.13 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 30         | R4.8.19 | 陰性 |
| 319 | R4.8.14 | 福山市   | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 20         | R4.8.19 | 陰性 |
| 320 | R4.8.16 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40         | R4.8.19 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 321 | R4.8.12 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 20         | R4.8.23 | 陰性 |
| 322 | R4.8.14 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 65         | 15         | R4.8.23 | 陰性 |
| 323 | R4.8.15 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 12         | R4.8.23 | 陰性 |
| 324 | R4.8.17 | 安芸太田町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 50         | R4.8.23 | 陰性 |
| 325 | R4.8.17 | 安芸太田町 | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 8          | R4.8.23 | 陰性 |
| 326 | R4.8.14 | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 50         | R4.8.23 | 陰性 |
| 327 | R4.8.14 | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 7          | R4.8.23 | 陰性 |
| 328 | R4.8.17 | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 35         | R4.8.23 | 陰性 |
| 329 | R4.8.20 | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 140        | 50         | R4.8.26 | 陰性 |
| 330 | R4.8.20 | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5          | R4.8.26 | 陰性 |
| 331 | R4.8.17 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 40         | R4.8.26 | 陰性 |
| 332 | R4.8.17 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 90         | 30         | R4.8.26 | 陰性 |
| 333 | R4.8.19 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 20         | R4.8.26 | 陰性 |
| 334 | R4.8.20 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 50         | R4.8.26 | 陰性 |
| 335 | R4.8.20 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 25         | R4.8.26 | 陰性 |
| 336 | R4.8.21 | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 50         | R4.8.26 | 陰性 |
| 337 | R4.8.22 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 45         | R4.8.26 | 陰性 |
| 338 | R4.8.13 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 4          | R4.8.26 | 陰性 |
| 339 | R4.8.21 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 95         | 30         | R4.8.26 | 陰性 |
| 340 | R4.8.24 | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 8          | R4.9.2  | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日   | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|--------|----|
| 341 | R4.8.24 | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 60         | R4.9.2 | 陰性 |
| 342 | R4.8.24 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 80         | 10         | R4.9.2 | 陰性 |
| 343 | R4.8.22 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 95         | 30         | R4.9.2 | 陰性 |
| 344 | R4.8.25 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 50         | R4.9.2 | 陰性 |
| 345 | R4.8.26 | 府中市   | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 80         | 10         | R4.9.2 | 陰性 |
| 346 | R4.8.27 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 6          | R4.9.2 | 陰性 |
| 347 | R4.8.31 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 20         | R4.9.6 | 陰性 |
| 348 | R4.8.30 | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 85         | 30         | R4.9.6 | 陰性 |
| 349 | R4.8.31 | 神石高原町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60         | R4.9.9 | 陰性 |
| 350 | R4.9.1  | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 3          | R4.9.9 | 陰性 |
| 351 | R4.9.1  | 庄原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 90         | 30         | R4.9.9 | 陰性 |
| 352 | R4.9.2  | 庄原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 12         | R4.9.9 | 陰性 |
| 353 | R4.8.28 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 20         | R4.9.9 | 陰性 |
| 354 | R4.8.29 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 75         | 15         | R4.9.9 | 陰性 |
| 355 | R4.8.31 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 10         | R4.9.9 | 陰性 |
| 356 | R4.9.3  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 35         | R4.9.9 | 陰性 |
| 357 | R4.9.3  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 35         | R4.9.9 | 陰性 |
| 358 | R4.8.28 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 4          | R4.9.9 | 陰性 |
| 359 | R4.9.4  | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 50         | R4.9.9 | 陰性 |
| 360 | R4.9.4  | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 50         | R4.9.9 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 361 | R4.9.4  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 8          | R4.9.9  | 陰性 |
| 362 | R4.9.5  | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 65         | 9          | R4.9.9  | 陰性 |
| 363 | R4.8.26 | 大崎上島町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 30         | R4.9.9  | 陰性 |
| 364 | R4.8.28 | 大崎上島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 40         | R4.9.9  | 陰性 |
| 365 | R4.8.29 | 大崎上島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40         | R4.9.9  | 陰性 |
| 366 | R4.8.31 | 大崎上島町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 50         | R4.9.9  | 陰性 |
| 367 | R4.8.28 | 大崎上島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 20         | R4.9.9  | 陰性 |
| 368 | R4.9.3  | 大崎上島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 30         | R4.9.9  | 陰性 |
| 369 | R4.9.3  | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 8          | R4.9.9  | 陰性 |
| 370 | R4.9.6  | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 0          | 15         | R4.9.9  | 陰性 |
| 371 | R4.9.7  | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 15         | R4.9.13 | 陰性 |
| 372 | R4.9.6  | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 30         | R4.9.13 | 陰性 |
| 373 | R4.9.6  | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 40         | R4.9.13 | 陰性 |
| 374 | R4.9.2  | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 26         | R4.9.13 | 陰性 |
| 375 | R4.9.2  | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 160        | 35         | R4.9.13 | 陰性 |
| 376 | R4.8.28 | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 50         | R4.9.13 | 陰性 |
| 377 | R4.9.4  | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 65         | R4.9.16 | 陰性 |
| 378 | R4.9.5  | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 25         | R4.9.16 | 陰性 |
| 379 | R4.9.6  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 20         | R4.9.16 | 陰性 |
| 380 | R4.9.7  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 12         | R4.9.16 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 381 | R4.9.11 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60         | R4.9.16 | 陰性 |
| 382 | R4.9.12 | 熊野町   | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 5          | R4.9.16 | 陰性 |
| 383 | R4.9.12 | 安芸太田町 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 20         | R4.9.20 | 陰性 |
| 384 | R4.9.13 | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 13         | R4.9.20 | 陰性 |
| 385 | R4.9.8  | 廿日市市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 30         | R4.9.20 | 陰性 |
| 386 | R4.9.15 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 140        | 100        | R4.9.20 | 陰性 |
| 387 | R4.9.16 | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 6          | R4.9.20 | 陰性 |
| 388 | R4.9.16 | 廿日市市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 7          | R4.9.20 | 陰性 |
| 389 | R4.9.13 | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 85         | 30         | R4.9.20 | 陰性 |
| 390 | R4.9.8  | 大崎上島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 30         | R4.9.20 | 陰性 |
| 391 | R4.9.8  | 大崎上島町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 40         | R4.9.20 | 陰性 |
| 392 | R4.9.14 | 大崎上島町 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 8          | R4.9.20 | 陰性 |
| 393 | R4.9.15 | 大崎上島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 30         | R4.9.20 | 陰性 |
| 394 | R4.9.20 | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 117        | 90         | R4.9.30 | 陰性 |
| 395 | R4.9.15 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 20         | R4.9.30 | 陰性 |
| 396 | R4.9.20 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 25         | R4.9.30 | 陰性 |
| 397 | R4.9.23 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40         | R4.9.30 | 陰性 |
| 398 | R4.9.23 | 熊野町   | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 35         | 10         | R4.9.30 | 陰性 |
| 399 | R4.9.23 | 熊野町   | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 35         | 10         | R4.9.30 | 陰性 |
| 400 | R4.9.23 | 大竹市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60         | R4.9.30 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 401 | R4.9.25 | 熊野町   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 28         | R4.9.30 | 陰性 |
| 402 | R4.9.19 | 坂町    | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 102        | 27         | R4.9.30 | 陰性 |
| 403 | R4.9.19 | 坂町    | 不明 | 捕獲 | 成獣 | 65         | 25         | R4.9.30 | 陰性 |
| 404 | R4.9.21 | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 20         | R4.9.30 | 陰性 |
| 405 | R4.9.26 | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 60         | R4.10.4 | 陰性 |
| 406 | R4.9.28 | 大竹市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60         | R4.10.4 | 陰性 |
| 407 | R4.9.22 | 大崎上島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 80         | R4.10.4 | 陰性 |
| 408 | R4.9.23 | 大崎上島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 30         | R4.10.4 | 陰性 |
| 409 | R4.9.28 | 安芸高田市 | 不明 | 捕獲 | 成獣 | 50         | 5          | R4.10.4 | 陰性 |
| 410 | R4.9.28 | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 15         | R4.10.4 | 陰性 |
| 411 | R4.9.29 | 安芸高田市 | 不明 | 捕獲 | 成獣 | 50         | 13         | R4.10.4 | 陰性 |
| 412 | R4.9.29 | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 15         | R4.10.4 | 陰性 |
| 413 | R4.9.29 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 80         | R4.10.7 | 陰性 |
| 414 | R4.9.21 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 40         | R4.10.7 | 陰性 |
| 415 | R4.9.27 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5          | R4.10.7 | 陰性 |
| 416 | R4.9.29 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 65         | 5          | R4.10.7 | 陰性 |
| 417 | R4.9.28 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 15         | R4.10.7 | 陰性 |
| 418 | R4.10.1 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 150        | 80         | R4.10.7 | 陰性 |
| 419 | R4.10.1 | 熊野町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 40         | 40         | R4.10.7 | 陰性 |
| 420 | R4.10.2 | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 18         | R4.10.7 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日     | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日     | 結果 |
|-----|----------|-------|----|----|----|------------|------------|----------|----|
| 421 | R4.9.29  | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 80         | 20         | R4.10.7  | 陰性 |
| 422 | R4.10.1  | 神石高原町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 55～60      | 10         | R4.10.7  | 陰性 |
| 423 | R4.10.1  | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 12         | R4.10.7  | 陰性 |
| 424 | R4.10.2  | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 15         | R4.10.7  | 陰性 |
| 425 | R4.10.4  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5          | R4.10.7  | 陰性 |
| 426 | R4.10.11 | 安芸太田町 | 雄  | 死亡 | 成獣 | 95         | 20         | R4.10.14 | 陽性 |
| 427 | R4.9.30  | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 25         | R4.10.14 | 陰性 |
| 428 | R4.10.2  | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 35         | R4.10.14 | 陰性 |
| 429 | R4.10.2  | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 40         | R4.10.14 | 陰性 |
| 430 | R4.10.3  | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5          | R4.10.14 | 陰性 |
| 431 | R4.10.5  | 廿日市市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 70         | R4.10.14 | 陰性 |
| 432 | R4.10.4  | 熊野町   | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 15         | 4          | R4.10.14 | 陰性 |
| 433 | R4.10.5  | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 50         | R4.10.14 | 陰性 |
| 434 | R4.10.7  | 神石高原町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 80         | R4.10.14 | 陰性 |
| 435 | R4.10.8  | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 15         | R4.10.14 | 陰性 |
| 436 | R4.10.11 | 大竹市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 50         | R4.10.14 | 陰性 |
| 437 | R4.10.6  | 廿日市市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 30         | R4.10.18 | 陰性 |
| 438 | R4.10.11 | 神石高原町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 45         | R4.10.18 | 陰性 |
| 439 | R4.10.11 | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 40         | R4.10.18 | 陰性 |
| 440 | R4.10.13 | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 85         | 50         | R4.10.18 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日     | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日     | 結果 |
|-----|----------|-------|----|----|----|------------|------------|----------|----|
| 441 | R4.10.13 | 大竹市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 115        | 45         | R4.10.21 | 陰性 |
| 442 | R4.10.16 | 廿日市市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 20         | R4.10.21 | 陰性 |
| 443 | R4.10.15 | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 20         | R4.10.21 | 陽性 |
| 444 | R4.10.19 | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40         | R4.10.28 | 陽性 |
| 445 | R4.10.28 | 廿日市市  | 不明 | 捕獲 | 成獣 | 60         | 30         | R4.11.8  | 陰性 |
| 446 | R4.10.31 | 廿日市市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 20         | R4.11.8  | 陰性 |
| 447 | R4.11.9  | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 90         | R4.11.15 | 陰性 |
| 448 | R4.11.15 | 広島市   | 雄  | 死亡 | 成獣 | 70         | 10         | R4.11.18 | 陽性 |
| 449 | R4.11.17 | 広島市   | 雌  | 死亡 | 成獣 | 65         | 5          | R4.11.22 | 陽性 |
| 450 | R4.11.21 | 広島市   | 雌  | 死亡 | 成獣 | 100        | 30         | R4.11.25 | 陽性 |
| 451 | R4.12.14 | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R4.12.20 | 陰性 |
| 452 | R4.12.17 | 大竹市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 115        | 80         | R5.2.3   | 陰性 |
| 453 | R4.12.15 | 廿日市市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 45         | R5.2.3   | 陰性 |
| 454 | R4.12.15 | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 20         | R5.2.3   | 陰性 |
| 455 | R4.12.27 | 安芸太田町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 10         | R5.2.3   | 陽性 |
| 456 | R5.1.3   | 大竹市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R5.2.3   | 陰性 |
| 457 | R4.12.30 | 大竹市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 118        | 70         | R5.2.3   | 陰性 |
| 458 | R5.1.1   | 大竹市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 38         | R5.2.3   | 陰性 |
| 459 | R5.1.9   | 広島市   | 雌  | 死亡 | 成獣 | 75         | 7          | R5.2.3   | 陽性 |
| 460 | R5.1.6   | 廿日市市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 20         | R5.2.3   | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 461 | R5.1.14 | 大竹市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 105        | 40         | R5.2.3  | 陰性 |
| 462 | R5.1.14 | 大竹市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 35         | R5.2.3  | 陰性 |
| 463 | R5.1.19 | 広島市  | 雌  | 死亡 | 成獣 | 80         | 10         | R5.2.3  | 陰性 |
| 464 | R5.1.24 | 大竹市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 45         | R5.2.3  | 陰性 |
| 465 | R5.1.30 | 廿日市市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 30         | R5.2.3  | 陰性 |
| 466 | R5.2.2  | 広島市  | 雌  | 死亡 | 成獣 | 80         | 15         | R5.2.7  | 陽性 |
| 467 | R5.2.1  | 廿日市市 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 80         | 25         | R5.2.7  | 陰性 |
| 468 | R5.2.2  | 大竹市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 125        | 65         | R5.2.10 | 陰性 |
| 469 | R5.2.7  | 廿日市市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R5.2.14 | 陽性 |
| 470 | R5.2.6  | 北広島町 | 雄  | 死亡 | 成獣 | 110        | 50         | R5.2.14 | 陽性 |
| 471 | R5.2.9  | 大竹市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 25         | R5.2.17 | 陰性 |
| 472 | R5.2.9  | 廿日市市 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 100        | 15         | R5.2.17 | 陰性 |
| 473 | R5.2.12 | 大竹市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 17         | R5.2.17 | 陰性 |
| 474 | R5.2.14 | 広島市  | 雄  | 死亡 | 成獣 | 100        | 15         | R5.2.17 | 陰性 |
| 475 | R5.2.15 | 江田島市 | 雄  | 死亡 | 成獣 | 120        | 80         | R5.2.21 | 陽性 |
| 476 | R5.2.20 | 大竹市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 80         | R5.2.28 | 陰性 |
| 477 | R5.2.27 | 東広島市 | 雄  | 死亡 | 成獣 | 90         | 40         | R5.3.3  | 陰性 |
| 478 | R5.3.2  | 北広島町 | 雄  | 死亡 | 成獣 | 100        | 35         | R5.3.7  | 陽性 |
| 479 | R5.3.14 | 北広島町 | 雄  | 死亡 | 成獣 | 140        | 80         | R5.3.17 | 陽性 |
| 480 | R5.4.17 | 江田島市 | 雌  | 死亡 | 成獣 | 100        | 30         | R5.4.21 | 陽性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 481 | R5.4.18 | 福山市   | 雌  | 死亡 | 成獣 | 130        | 60         | R5.4.21 | 陰性 |
| 482 | R5.4.18 | 北広島町  | 雌  | 死亡 | 幼獣 | 80         | 10         | R5.4.21 | 陽性 |
| 483 | R5.4.22 | 江田島市  | 雄  | 死亡 | 成獣 | 130        | 60         | R5.4.28 | 陽性 |
| 484 | R5.4.26 | 東広島市  | 雄  | 死亡 | 成獣 | 110        | 50         | R5.5.2  | 陽性 |
| 485 | R5.4.26 | 江田島市  | 雄  | 死亡 | 成獣 | 100        | 15         | R5.5.2  | 陰性 |
| 486 | R5.6.1  | 大竹市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 45         | R5.6.9  | 陰性 |
| 487 | R5.6.1  | 熊野町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 60         | R5.6.9  | 陽性 |
| 488 | R5.6.1  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 35         | R5.6.13 | 陰性 |
| 489 | R5.6.3  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 65         | R5.6.13 | 陰性 |
| 490 | R5.6.3  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 30         | R5.6.13 | 陰性 |
| 491 | R5.6.5  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 30         | R5.6.13 | 陰性 |
| 492 | R5.6.6  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 2          | R5.6.13 | 陰性 |
| 493 | R5.6.6  | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 25         | R5.6.13 | 陰性 |
| 494 | R5.6.10 | 東広島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 50         | R5.6.15 | 陰性 |
| 495 | R5.6.12 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R5.6.15 | 陰性 |
| 496 | R5.6.8  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 4          | R5.6.16 | 陰性 |
| 497 | R5.6.11 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 5          | R5.6.16 | 陰性 |
| 498 | R5.6.11 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 85         | 40         | R5.6.16 | 陰性 |
| 499 | R5.6.14 | 熊野町   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 30         | R5.6.16 | 陰性 |
| 500 | R5.6.22 | 呉市    | 雌  | 死亡 | 成獣 | 100        | 50         | R5.6.27 | 陽性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 501 | R5.6.21 | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 35         | R5.6.27 | 陰性 |
| 502 | R5.6.15 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 35         | R5.6.27 | 陰性 |
| 503 | R5.6.20 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40         | R5.6.27 | 陰性 |
| 504 | R5.6.20 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 80         | 10         | R5.6.27 | 陰性 |
| 505 | R5.6.20 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 25         | R5.6.27 | 陰性 |
| 506 | R5.6.15 | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 50         | R5.6.27 | 陰性 |
| 507 | R5.6.15 | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 55         | R5.6.27 | 陰性 |
| 508 | R5.6.23 | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 65         | R5.6.27 | 陰性 |
| 509 | R5.6.6  | 大崎上島町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 70         | R5.6.30 | 陰性 |
| 510 | R5.6.7  | 大崎上島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 93         | 60         | R5.6.30 | 陰性 |
| 511 | R5.6.8  | 大崎上島町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 75         | R5.6.30 | 陰性 |
| 512 | R5.6.16 | 大崎上島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R5.6.30 | 陰性 |
| 513 | R5.6.24 | 大崎上島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 85         | 40         | R5.6.30 | 陰性 |
| 514 | R5.6.22 | 神石高原町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 100        | R5.6.30 | 陰性 |
| 515 | R5.6.23 | 神石高原町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60         | R5.6.30 | 陰性 |
| 516 | R5.6.26 | 安芸太田町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 60         | R5.6.30 | 陰性 |
| 517 | R5.6.26 | 安芸太田町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 20         | R5.6.30 | 陰性 |
| 518 | R5.6.27 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 30         | R5.6.30 | 陰性 |
| 519 | R5.6.27 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 4          | R5.7.4  | 陰性 |
| 520 | R5.6.25 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40         | R5.7.4  | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 521 | R5.6.25 | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 10         | R5.7.4  | 陰性 |
| 522 | R5.6.23 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 50         | R5.7.4  | 陰性 |
| 523 | R5.6.25 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 25         | R5.7.4  | 陰性 |
| 524 | R5.6.25 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 25         | R5.7.4  | 陰性 |
| 525 | R5.6.26 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40         | R5.7.4  | 陰性 |
| 526 | R5.7.3  | 呉市   | 雄  | 死亡 | 成獣 | 120        | 60         | R5.7.7  | 陽性 |
| 527 | R5.7.2  | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 140        | R5.7.7  | 陰性 |
| 528 | R5.6.29 | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 6          | R5.7.11 | 陰性 |
| 529 | R5.7.1  | 坂町   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 65         | 15         | R5.7.11 | 陰性 |
| 530 | R5.7.4  | 江田島市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 30         | R5.7.11 | 陰性 |
| 531 | R5.6.30 | 三次市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 60         | R5.7.11 | 陰性 |
| 532 | R5.6.30 | 三次市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 60         | R5.7.11 | 陰性 |
| 533 | R5.6.24 | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 45         | R5.7.11 | 陰性 |
| 534 | R5.6.30 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 25         | R5.7.11 | 陰性 |
| 535 | R5.6.30 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 60         | R5.7.11 | 陰性 |
| 536 | R5.6.30 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 40         | R5.7.11 | 陰性 |
| 537 | R5.7.2  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 20         | R5.7.11 | 陰性 |
| 538 | R5.7.3  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 45         | R5.7.11 | 陰性 |
| 539 | R5.7.3  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 125        | 75         | R5.7.11 | 陰性 |
| 540 | R5.7.4  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 45         | 6          | R5.7.11 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 541 | R5.7.6  | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60         | R5.7.14 | 陰性 |
| 542 | R5.7.6  | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 90         | R5.7.14 | 陰性 |
| 543 | R5.7.7  | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 40         | R5.7.14 | 陰性 |
| 544 | R5.7.9  | 三次市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 100        | R5.7.14 | 陰性 |
| 545 | R5.7.9  | 三次市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 40         | R5.7.14 | 陰性 |
| 546 | R5.7.8  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60         | R5.7.14 | 陰性 |
| 547 | R5.7.11 | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40         | R5.7.21 | 陰性 |
| 548 | R5.7.8  | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 150        | 60         | R5.7.21 | 陰性 |
| 549 | R5.7.9  | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R5.7.21 | 陰性 |
| 550 | R5.7.9  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 10         | R5.7.21 | 陰性 |
| 551 | R5.7.10 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40         | R5.7.21 | 陰性 |
| 552 | R5.7.12 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5          | R5.7.21 | 陰性 |
| 553 | R5.7.12 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R5.7.21 | 陰性 |
| 554 | R5.7.10 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 70         | R5.7.21 | 陰性 |
| 555 | R5.7.12 | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 15         | R5.7.21 | 陰性 |
| 556 | R5.7.6  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 40         | R5.7.21 | 陰性 |
| 557 | R5.7.6  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 65         | 30         | R5.7.21 | 陰性 |
| 558 | R5.7.7  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 20         | R5.7.21 | 陰性 |
| 559 | R5.7.7  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 50         | R5.7.21 | 陰性 |
| 560 | R5.7.10 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 75         | 40         | R5.7.21 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 561 | R5.7.10 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 75         | 30         | R5.7.21 | 陰性 |
| 562 | R5.7.12 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40         | R5.7.21 | 陰性 |
| 563 | R5.7.12 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 4          | R5.7.21 | 陰性 |
| 564 | R5.7.10 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 80         | R5.7.21 | 陰性 |
| 565 | R5.7.13 | 東広島市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 90         | 35         | R5.7.21 | 陰性 |
| 566 | R5.7.12 | 安芸太田町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 50         | R5.7.21 | 陰性 |
| 567 | R5.6.25 | 呉市    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R5.7.21 | 陰性 |
| 568 | R5.6.25 | 呉市    | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 20         | R5.7.21 | 陰性 |
| 569 | R5.6.28 | 呉市    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40         | R5.7.21 | 陰性 |
| 570 | R5.7.1  | 呉市    | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 20         | R5.7.21 | 陰性 |
| 571 | R5.7.2  | 呉市    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R5.7.21 | 陰性 |
| 572 | R5.7.13 | 大竹市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 15         | R5.7.21 | 陰性 |
| 573 | R5.7.14 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40         | R5.7.21 | 陰性 |
| 574 | R5.7.15 | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60         | R5.7.21 | 陰性 |
| 575 | R5.7.14 | 府中町   | 雄  | 死亡 | 幼獣 | 50         | 2          | R5.7.21 | 陰性 |
| 576 | R5.7.14 | 広島市   | 雌  | 死亡 | 幼獣 | 50         | 2          | R5.7.21 | 陰性 |
| 577 | R5.7.17 | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 150        | 80         | R5.7.25 | 陰性 |
| 578 | R5.7.15 | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 15         | R5.7.25 | 陰性 |
| 579 | R5.7.11 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 45         | 12         | R5.7.25 | 陰性 |
| 580 | R5.7.12 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 11         | R5.7.25 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 581 | R5.7.15 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 85         | 65         | R5.7.25 | 陰性 |
| 582 | R5.7.15 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 111        | 80         | R5.7.25 | 陰性 |
| 583 | R5.7.16 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 60         | R5.7.25 | 陰性 |
| 584 | R5.7.18 | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 6          | R5.7.25 | 陰性 |
| 585 | R5.7.14 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60         | R5.7.25 | 陰性 |
| 586 | R5.7.18 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R5.7.25 | 陰性 |
| 587 | R5.7.14 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 20         | R5.7.25 | 陰性 |
| 588 | R5.7.17 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 70         | R5.7.25 | 陰性 |
| 589 | R5.7.11 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 75         | 30         | R5.7.25 | 陰性 |
| 590 | R5.7.14 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 5          | R5.7.25 | 陰性 |
| 591 | R5.7.15 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 65         | 30         | R5.7.25 | 陰性 |
| 592 | R5.7.15 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 7          | R5.7.25 | 陰性 |
| 593 | R5.7.16 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 50         | R5.7.25 | 陰性 |
| 594 | R5.7.17 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 10         | R5.7.25 | 陰性 |
| 595 | R5.7.18 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 15         | R5.7.25 | 陰性 |
| 596 | R5.7.18 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 6          | R5.7.25 | 陰性 |
| 597 | R5.7.19 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 15         | R5.7.25 | 陰性 |
| 598 | R5.7.19 | 神石高原町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 80         | R5.7.25 | 陰性 |
| 599 | R5.7.13 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 140        | 50         | R5.7.25 | 陰性 |
| 600 | R5.7.14 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5          | R5.7.25 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 601 | R5.7.17 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 160        | 70         | R5.7.25 | 陰性 |
| 602 | R5.7.18 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 6          | R5.7.25 | 陰性 |
| 603 | R5.7.18 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R5.7.25 | 陰性 |
| 604 | R5.7.19 | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 65         | 18         | R5.7.28 | 陰性 |
| 605 | R5.7.21 | 大竹市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 12         | R5.7.28 | 陰性 |
| 606 | R5.6.29 | 大崎上島町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 125        | 90         | R5.7.28 | 陰性 |
| 607 | R5.7.7  | 大崎上島町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60         | R5.7.28 | 陰性 |
| 608 | R5.7.14 | 大崎上島町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 90         | R5.7.28 | 陰性 |
| 609 | R5.7.20 | 大崎上島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 35         | R5.7.28 | 陰性 |
| 610 | R5.7.20 | 大崎上島町 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 35         | 7          | R5.7.28 | 陰性 |
| 611 | R5.7.19 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 150        | 80         | R5.7.28 | 陰性 |
| 612 | R5.7.23 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 35         | 3          | R5.7.28 | 陰性 |
| 613 | R5.7.24 | 神石高原町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 50         | R5.8.1  | 陰性 |
| 614 | R5.7.18 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 35         | 9          | R5.8.1  | 陰性 |
| 615 | R5.7.21 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 32         | 12         | R5.8.1  | 陰性 |
| 616 | R5.7.21 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 10         | 9          | R5.8.1  | 陰性 |
| 617 | R5.7.21 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 120        | R5.8.1  | 陰性 |
| 618 | R5.7.23 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 10         | R5.8.1  | 陰性 |
| 619 | R5.7.24 | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40         | R5.8.1  | 陰性 |
| 620 | R5.7.25 | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 35         | R5.8.1  | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日   | 結果 |
|-----|---------|------|----|----|----|------------|------------|--------|----|
| 621 | R5.7.27 | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R5.8.1 | 陰性 |
| 622 | R5.7.19 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 30         | R5.8.1 | 陰性 |
| 623 | R5.7.19 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 7          | R5.8.1 | 陰性 |
| 624 | R5.7.19 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 45         | 18         | R5.8.1 | 陰性 |
| 625 | R5.7.19 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40         | R5.8.1 | 陰性 |
| 626 | R5.7.20 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 20         | R5.8.1 | 陰性 |
| 627 | R5.7.20 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 35         | R5.8.1 | 陰性 |
| 628 | R5.7.21 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 8          | R5.8.1 | 陰性 |
| 629 | R5.7.21 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 50         | R5.8.1 | 陰性 |
| 630 | R5.7.21 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 45         | R5.8.1 | 陰性 |
| 631 | R5.7.22 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 5          | R5.8.1 | 陰性 |
| 632 | R5.7.22 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 40         | 20         | R5.8.1 | 陰性 |
| 633 | R5.7.23 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 95         | 30         | R5.8.1 | 陰性 |
| 634 | R5.7.23 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 15         | R5.8.1 | 陰性 |
| 635 | R5.7.24 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 35         | 7          | R5.8.1 | 陰性 |
| 636 | R5.7.25 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 35         | 8          | R5.8.1 | 陰性 |
| 637 | R5.7.25 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 30         | R5.8.1 | 陰性 |
| 638 | R5.7.26 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 30         | R5.8.1 | 陰性 |
| 639 | R5.7.27 | 大竹市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 20         | R5.8.1 | 陰性 |
| 640 | R5.7.28 | 府中市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 35         | R5.8.4 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日   | 結果 |
|-----|---------|------|----|----|----|------------|------------|--------|----|
| 641 | R5.7.30 | 府中市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 20         | R5.8.4 | 陰性 |
| 642 | R5.7.22 | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R5.8.4 | 陰性 |
| 643 | R5.7.22 | 福山市  | 不明 | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40         | R5.8.4 | 陰性 |
| 644 | R5.7.23 | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 10         | R5.8.4 | 陰性 |
| 645 | R5.7.23 | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 150        | 50         | R5.8.4 | 陰性 |
| 646 | R5.7.26 | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40         | R5.8.4 | 陰性 |
| 647 | R5.7.27 | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 10         | R5.8.4 | 陰性 |
| 648 | R5.7.28 | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 5          | R5.8.4 | 陰性 |
| 649 | R5.7.28 | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 30         | R5.8.4 | 陰性 |
| 650 | R5.7.28 | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 10         | R5.8.4 | 陰性 |
| 651 | R5.7.28 | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 10         | R5.8.4 | 陰性 |
| 652 | R5.7.29 | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 30         | R5.8.4 | 陰性 |
| 653 | R5.7.29 | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40         | R5.8.4 | 陰性 |
| 654 | R5.7.29 | 大竹市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R5.8.4 | 陰性 |
| 655 | R5.7.30 | 江田島市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 30         | R5.8.8 | 陰性 |
| 656 | R5.7.26 | 竹原市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 10         | R5.8.8 | 陰性 |
| 657 | R5.7.26 | 竹原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 43         | 50         | R5.8.8 | 陰性 |
| 658 | R5.7.29 | 竹原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 45         | 51         | R5.8.8 | 陰性 |
| 659 | R5.7.29 | 竹原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 55         | R5.8.8 | 陰性 |
| 660 | R5.7.30 | 竹原市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 5          | R5.8.8 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 661 | R5.7.28 | 安芸太田町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 28         | R5.8.8  | 陰性 |
| 662 | R5.7.26 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 160        | 70         | R5.8.8  | 陰性 |
| 663 | R5.7.27 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 40         | R5.8.8  | 陰性 |
| 664 | R5.7.30 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 50         | R5.8.8  | 陰性 |
| 665 | R5.7.30 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 30         | R5.8.8  | 陰性 |
| 666 | R5.7.31 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 40         | R5.8.8  | 陰性 |
| 667 | R5.7.31 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 10         | R5.8.8  | 陰性 |
| 668 | R5.7.31 | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 10         | R5.8.8  | 陰性 |
| 669 | R5.8.3  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 40         | R5.8.18 | 陰性 |
| 670 | R5.8.1  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 60         | R5.8.18 | 陰性 |
| 671 | R5.8.2  | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 8          | R5.8.18 | 陰性 |
| 672 | R5.7.30 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 45         | R5.8.18 | 陰性 |
| 673 | R5.7.31 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 50         | R5.8.18 | 陰性 |
| 674 | R5.8.1  | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 60         | R5.8.18 | 陰性 |
| 675 | R5.8.1  | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 90         | R5.8.18 | 陰性 |
| 676 | R5.8.2  | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 120        | R5.8.18 | 陰性 |
| 677 | R5.8.4  | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 7          | R5.8.18 | 陰性 |
| 678 | R5.8.5  | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5          | R5.8.18 | 陰性 |
| 679 | R5.8.5  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 150        | 70         | R5.8.18 | 陰性 |
| 680 | R5.8.5  | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 150        | 80         | R5.8.22 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 681 | R5.8.4  | 神石高原町 | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 45         | 15         | R5.8.22 | 陰性 |
| 682 | R5.8.5  | 神石高原町 | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 45         | 15         | R5.8.22 | 陰性 |
| 683 | R5.8.6  | 神石高原町 | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 15         | R5.8.22 | 陰性 |
| 684 | R5.8.8  | 神石高原町 | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 45         | 15         | R5.8.22 | 陰性 |
| 685 | R5.8.8  | 神石高原町 | 不明 | 捕獲 | 成獣 | 80         | 50         | R5.8.22 | 陰性 |
| 686 | R5.8.8  | 大竹市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 20         | R5.8.22 | 陰性 |
| 687 | R5.8.8  | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40         | R5.8.22 | 陰性 |
| 688 | R5.8.8  | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 3          | R5.8.22 | 陰性 |
| 689 | R5.8.8  | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 75         | 30         | R5.8.22 | 陰性 |
| 690 | R5.8.1  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 40         | R5.8.22 | 陰性 |
| 691 | R5.8.9  | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 40         | R5.8.22 | 陰性 |
| 692 | R5.8.10 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 30         | R5.8.22 | 陰性 |
| 693 | R5.8.9  | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 7          | R5.8.22 | 陰性 |
| 694 | R5.8.9  | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 50         | R5.8.22 | 陰性 |
| 695 | R5.8.10 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 6          | R5.8.22 | 陰性 |
| 696 | R5.8.11 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 8          | R5.8.22 | 陰性 |
| 697 | R5.8.12 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 7          | R5.8.22 | 陰性 |
| 698 | R5.8.12 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 7          | R5.8.22 | 陰性 |
| 699 | R5.8.16 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 75         | 80         | R5.8.22 | 陰性 |
| 700 | R5.8.15 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 65         | 35         | R5.8.22 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 701 | R5.8.17 | 庄原市   | 雄  | 死亡 | 成獣 | 80         | 12         | R5.8.22 | 陰性 |
| 702 | R5.8.18 | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 30         | R5.8.25 | 陰性 |
| 703 | R5.8.18 | 庄原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 45         | R5.8.25 | 陰性 |
| 704 | R5.8.19 | 庄原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 70         | R5.8.25 | 陰性 |
| 705 | R5.8.20 | 大竹市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 55         | 20         | R5.8.25 | 陰性 |
| 706 | R5.8.18 | 広島市   | 雌  | 死亡 | 成獣 | 70         | 20         | R5.8.25 | 陽性 |
| 707 | R5.8.20 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 2          | R5.8.29 | 陽性 |
| 708 | R5.8.20 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 50         | R5.8.29 | 陰性 |
| 709 | R5.8.21 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 75         | 25         | R5.8.29 | 陰性 |
| 710 | R5.8.19 | 庄原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 35         | R5.8.29 | 陰性 |
| 711 | R5.8.22 | 神石高原町 | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 10         | R5.9.1  | 陰性 |
| 712 | R5.8.24 | 庄原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 72         | R5.9.1  | 陰性 |
| 713 | R5.8.27 | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 60         | R5.9.1  | 陰性 |
| 714 | R5.8.20 | 大竹市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 45         | 7          | R5.9.1  | 陰性 |
| 715 | R5.8.28 | 庄原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 51.5       | R5.9.1  | 陰性 |
| 716 | R5.8.27 | 東広島市  | 雄  | 死亡 | 成獣 | 100        | 50         | R5.9.1  | 陽性 |
| 717 | R5.8.29 | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 8          | R5.9.5  | 陰性 |
| 718 | R5.8.26 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 20         | R5.9.5  | 陰性 |
| 719 | R5.8.28 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R5.9.5  | 陰性 |
| 720 | R5.8.28 | 安芸太田町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 20         | R5.9.5  | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日     | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日     | 結果 |
|-----|----------|-------|----|----|----|------------|------------|----------|----|
| 721 | R5.8.31  | 大竹市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 50         | R5.9.5   | 陰性 |
| 722 | R5.9.1   | 大竹市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 60         | R5.9.8   | 陰性 |
| 723 | R5.9.2   | 大竹市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 25         | R5.9.8   | 陰性 |
| 724 | R5.8.30  | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 30         | R5.9.8   | 陰性 |
| 725 | R5.9.3   | 廿日市市  | 不明 | 捕獲 | 成獣 | 130        | 60         | R5.9.8   | 陰性 |
| 726 | R5.9.2   | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40         | R5.9.12  | 陽性 |
| 727 | R5.9.4   | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 不明 | 75         | 15         | R5.9.12  | 陽性 |
| 728 | R5.9.5   | 安芸太田町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 40         | R5.9.12  | 陰性 |
| 729 | R5.9.9   | 東広島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 70         | R5.9.15  | 陰性 |
| 730 | R5.9.9   | 安芸太田町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 105        | 40         | R5.9.15  | 陰性 |
| 731 | R5.9.9   | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 35         | R5.9.22  | 陽性 |
| 732 | R5.9.9   | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 135        | 80         | R5.9.22  | 陰性 |
| 733 | R5.9.15  | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 4          | R5.9.22  | 陰性 |
| 734 | R5.10.16 | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 90         | 20         | R5.10.27 | 陰性 |
| 735 | R5.10.17 | 廿日市市  | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 80         | 15         | R5.10.27 | 陰性 |
| 736 | R5.10.17 | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 30         | R5.10.27 | 陰性 |
| 737 | R5.10.22 | 福山市   | 雄  | 死亡 | 成獣 | 80         | 40         | R5.10.27 | 陰性 |
| 738 | R5.10.23 | 世羅町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 78         | R5.10.31 | 陰性 |
| 739 | R5.10.31 | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 15         | R5.10.31 | 陰性 |
| 740 | R5.10.31 | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 15         | R5.11.10 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日     | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日     | 結果 |
|-----|----------|-------|----|----|----|------------|------------|----------|----|
| 741 | R5.10.23 | 安芸太田町 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 20         | R5.11.10 | 陰性 |
| 742 | R5.10.23 | 安芸太田町 | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 10         | R5.11.10 | 陰性 |
| 743 | R5.10.31 | 安芸太田町 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 10         | R5.11.10 | 陰性 |
| 744 | R5.11.3  | 世羅町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 67         | R5.11.10 | 陰性 |
| 745 | R5.11.11 | 広島市   | 雌  | 死亡 | 成獣 | 130        | 60         | R5.11.17 | 陰性 |
| 746 | R5.11.22 | 廿日市市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 80         | 25         | R5.12.1  | 陰性 |
| 747 | R5.11.23 | 福山市   | 雄  | 死亡 | 幼獣 | 80         | 12         | R5.12.1  | 陰性 |
| 748 | R5.11.23 | 福山市   | 雌  | 死亡 | 成獣 | 120        | 60         | R5.12.1  | 陰性 |
| 749 | R5.12.3  | 廿日市市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 60         | R5.12.8  | 陰性 |
| 750 | R5.12.5  | 世羅町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 125        | 75         | R5.12.8  | 陰性 |
| 751 | R5.12.5  | 世羅町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 30         | R5.12.8  | 陰性 |
| 752 | R5.12.9  | 廿日市市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 100        | 15         | R5.12.15 | 陰性 |
| 753 | R5.12.12 | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 15         | R5.12.15 | 陰性 |
| 754 | R5.12.16 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 140        | 80         | R5.12.21 | 陰性 |
| 755 | R5.12.17 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40         | R5.12.21 | 陰性 |
| 756 | R5.12.17 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 160        | 90         | R5.12.21 | 陰性 |
| 757 | R5.12.24 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R6.1.12  | 陰性 |
| 758 | R5.12.24 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 60         | R6.1.12  | 陰性 |
| 759 | R5.12.24 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 70         | R6.1.12  | 陰性 |
| 760 | R5.12.23 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60         | R6.1.12  | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日     | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|----------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 761 | R5.12.22 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 80         | R6.1.12 | 陰性 |
| 762 | R5.12.25 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 30         | R6.1.12 | 陰性 |
| 763 | R5.12.25 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 25         | R6.1.12 | 陰性 |
| 764 | R6.1.4   | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 30         | R6.1.16 | 陽性 |
| 765 | R6.1.21  | 廿日市市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 20         | R6.1.26 | 陰性 |
| 766 | R6.1.7   | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 60         | R6.1.26 | 陰性 |
| 767 | R6.1.19  | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 45         | R6.1.30 | 陰性 |
| 768 | R6.1.24  | 尾道市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 12         | R6.2.2  | 陰性 |
| 769 | R6.1.26  | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 45         | R6.2.2  | 陰性 |
| 770 | R6.1.30  | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 50         | R6.2.2  | 陰性 |
| 771 | R6.1.31  | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 85         | 70         | R6.2.6  | 陰性 |
| 772 | R6.1.30  | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 15         | R6.2.6  | 陽性 |
| 773 | R6.2.4   | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 125        | 50         | R6.2.16 | 陽性 |
| 774 | R6.2.5   | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 78         | 27         | R6.2.16 | 陰性 |
| 775 | R6.2.10  | 廿日市市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 90         | 25         | R6.2.16 | 陰性 |
| 776 | R6.2.14  | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40         | R6.2.20 | 陰性 |
| 777 | R6.2.16  | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 70         | R6.2.22 | 陰性 |
| 778 | R6.2.16  | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 50         | R6.2.22 | 陰性 |
| 779 | R6.2.17  | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 30         | R6.2.22 | 陰性 |
| 780 | R6.2.19  | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 45         | R6.2.22 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 781 | R6.2.25 | 尾道市   | 雌  | 死亡 | 成獣 | 80         | 50         | R6.3.1  | 陰性 |
| 782 | R6.2.25 | 安芸高田市 | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 80         | 15         | R6.3.4  | 陽性 |
| 783 | R6.2.26 | 三次市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 40         | R6.3.4  | 陰性 |
| 784 | R6.2.28 | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 25         | R6.3.4  | 陰性 |
| 785 | R6.2.28 | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 10         | R6.3.4  | 陽性 |
| 786 | R6.3.1  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 30         | R6.3.8  | 陰性 |
| 787 | R6.3.3  | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60         | R6.3.8  | 陽性 |
| 788 | R6.3.4  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 20         | R6.3.8  | 陰性 |
| 789 | R6.3.1  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 77         | 28         | R6.3.12 | 陰性 |
| 790 | R6.3.2  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 125        | 65         | R6.3.12 | 陰性 |
| 791 | R6.3.1  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 10         | R6.3.12 | 陰性 |
| 792 | R6.3.1  | 尾道市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 30         | R6.3.15 | 陰性 |
| 793 | R6.3.12 | 府中町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 50         | R6.3.15 | 陽性 |
| 794 | R6.3.10 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 30         | R6.3.19 | 陰性 |
| 795 | R6.3.6  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R6.3.19 | 陰性 |
| 796 | R6.3.22 | 尾道市   | 雄  | 死亡 | 成獣 | 120        | 60         | R6.3.29 | 陽性 |
| 797 | R6.4.10 | 福山市   | 雄  | 死亡 | 幼獣 | 80         | 8          | R6.4.16 | 陽性 |
| 798 | R6.6.2  | 安芸高田市 | 雄  | 死亡 | 成獣 | 100        | 30         | R6.6.7  | 陽性 |
| 799 | R6.6.14 | 尾道市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 80         | R6.6.21 | 陰性 |
| 800 | R6.6.16 | 尾道市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 40         | R6.6.21 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 801 | R6.6.16 | 尾道市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 40         | R6.6.21 | 陰性 |
| 802 | R6.6.16 | 尾道市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 40         | R6.6.21 | 陰性 |
| 803 | R6.6.16 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 50         | R6.6.21 | 陰性 |
| 804 | R6.6.18 | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 40         | R6.6.28 | 陰性 |
| 805 | R6.6.19 | 庄原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 35         | R6.6.28 | 陰性 |
| 806 | R6.6.19 | 庄原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 65         | 37         | R6.6.28 | 陰性 |
| 807 | R6.6.14 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 125        | 90         | R6.6.28 | 陰性 |
| 808 | R6.6.15 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 95         | 35         | R6.6.28 | 陰性 |
| 809 | R6.6.16 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 30         | R6.6.28 | 陰性 |
| 810 | R6.6.15 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 140        | 50         | R6.6.28 | 陽性 |
| 811 | R6.6.15 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60         | R6.6.28 | 陰性 |
| 812 | R6.6.18 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 70         | R6.6.28 | 陰性 |
| 813 | R6.6.20 | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R6.6.28 | 陰性 |
| 814 | R6.6.21 | 安芸太田町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 20         | R6.6.28 | 陰性 |
| 815 | R6.6.21 | 安芸太田町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 20         | R6.6.28 | 陰性 |
| 816 | R6.6.24 | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60         | R6.7.2  | 陰性 |
| 817 | R6.6.19 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 35         | 23         | R6.7.2  | 陰性 |
| 818 | R6.6.20 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 32         | 20         | R6.7.2  | 陰性 |
| 819 | R6.6.21 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 50         | R6.7.2  | 陰性 |
| 820 | R6.6.22 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 100        | R6.7.2  | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日   | 結果 |
|-----|---------|------|----|----|----|------------|------------|--------|----|
| 821 | R6.6.25 | 竹原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60         | R6.7.2 | 陰性 |
| 822 | R6.6.25 | 北広島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 60         | R6.7.2 | 陰性 |
| 823 | R6.6.22 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40         | R6.7.2 | 陰性 |
| 824 | R6.6.26 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40         | R6.7.2 | 陰性 |
| 825 | R6.6.26 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 45         | 6          | R6.7.2 | 陰性 |
| 826 | R6.6.27 | 府中市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 25.0       | R6.7.5 | 陽性 |
| 827 | R6.6.19 | 坂町   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 1.0        | R6.7.5 | 陰性 |
| 828 | R6.6.30 | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 80.0       | R6.7.5 | 陰性 |
| 829 | R6.6.30 | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 85.0       | R6.7.5 | 陰性 |
| 830 | R6.7.1  | 世羅町  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 43.6       | R6.7.9 | 陰性 |
| 831 | R6.6.30 | 三次市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 40.0       | R6.7.9 | 陰性 |
| 832 | R6.6.30 | 三次市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 40.0       | R6.7.9 | 陰性 |
| 833 | R6.6.26 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 3.0        | R6.7.9 | 陰性 |
| 834 | R6.6.30 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 50.0       | R6.7.9 | 陰性 |
| 835 | R6.7.2  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 50.0       | R6.7.9 | 陰性 |
| 836 | R6.6.28 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 4.0        | R6.7.9 | 陰性 |
| 837 | R6.6.30 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 65.0       | R6.7.9 | 陰性 |
| 838 | R6.6.30 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 12.0       | R6.7.9 | 陽性 |
| 839 | R6.7.1  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 10.0       | R6.7.9 | 陰性 |
| 840 | R6.6.29 | 北広島町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 35.0       | R6.7.9 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 841 | R6.7.4  | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 85         | R6.7.12 | 陰性 |
| 842 | R6.6.27 | 坂町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 70         | R6.7.12 | 陰性 |
| 843 | R6.6.29 | 呉市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 60         | R6.7.12 | 陰性 |
| 844 | R6.7.1  | 呉市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R6.7.12 | 陰性 |
| 845 | R6.7.2  | 呉市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 90         | R6.7.12 | 陰性 |
| 846 | R6.7.2  | 呉市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40         | R6.7.12 | 陰性 |
| 847 | R6.7.3  | 呉市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60         | R6.7.12 | 陰性 |
| 848 | R6.7.6  | 東広島市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60         | R6.7.12 | 陰性 |
| 849 | R6.6.29 | 尾道市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 30         | R6.7.12 | 陰性 |
| 850 | R6.6.25 | 竹原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 70         | R6.7.12 | 陰性 |
| 851 | R6.6.27 | 竹原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 70         | R6.7.12 | 陰性 |
| 852 | R6.7.3  | 竹原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 40         | 20         | R6.7.12 | 陰性 |
| 853 | R6.7.4  | 竹原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 70         | R6.7.12 | 陰性 |
| 854 | R6.7.6  | 竹原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 70         | R6.7.12 | 陰性 |
| 855 | R6.7.7  | 竹原市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 20         | R6.7.12 | 陰性 |
| 856 | R6.7.3  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 5          | R6.7.19 | 陰性 |
| 857 | R6.7.3  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 90         | R6.7.19 | 陰性 |
| 858 | R6.7.7  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 4          | R6.7.19 | 陰性 |
| 859 | R6.7.4  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 90         | 30         | R6.7.19 | 陰性 |
| 860 | R5.7.4  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 15         | R6.7.19 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 861 | R6.7.4  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 50         | R6.7.19 | 陰性 |
| 862 | R6.7.5  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 3          | R6.7.19 | 陰性 |
| 863 | R6.7.7  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 118        | 65         | R6.7.19 | 陰性 |
| 864 | R6.7.8  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 25         | R6.7.19 | 陰性 |
| 865 | R6.7.11 | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 30         | R6.7.19 | 陰性 |
| 866 | R6.7.15 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 3          | R6.7.19 | 陰性 |
| 867 | R6.7.15 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 35         | R6.7.19 | 陰性 |
| 868 | R6.7.10 | 世羅町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 125        | 65         | R6.7.19 | 陰性 |
| 869 | R6.7.16 | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5          | R6.7.19 | 陰性 |
| 870 | R6.7.14 | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 80         | R6.7.19 | 陰性 |
| 871 | R6.7.6  | 広島市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 40         | R6.7.19 | 陰性 |
| 872 | R6.7.11 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40         | R6.7.23 | 陰性 |
| 873 | R6.7.13 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 70         | R6.7.23 | 陰性 |
| 874 | R6.7.15 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60         | R6.7.23 | 陽性 |
| 875 | R6.7.16 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 10         | R6.7.23 | 陽性 |
| 876 | R6.7.13 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60         | R6.7.23 | 陰性 |
| 877 | R6.7.13 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5          | R6.7.23 | 陰性 |
| 878 | R6.7.15 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R6.7.23 | 陰性 |
| 879 | R6.7.15 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40         | R6.7.23 | 陰性 |
| 880 | R6.7.17 | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 30         | R6.7.23 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 881 | R6.7.9  | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 45         | R6.7.23 | 陰性 |
| 882 | R6.7.18 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 50         | R6.7.23 | 陰性 |
| 883 | R6.7.16 | 安芸太田町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 30         | R6.7.23 | 陰性 |
| 884 | R6.7.18 | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 30         | R6.7.26 | 陰性 |
| 885 | R6.7.19 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 10         | R6.7.26 | 陰性 |
| 886 | R6.7.19 | 庄原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 26         | R6.7.26 | 陽性 |
| 887 | R6.7.14 | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 115        | 60         | R6.7.26 | 陰性 |
| 888 | R6.7.15 | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 95         | 40         | R6.7.26 | 陰性 |
| 889 | R6.7.15 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 10         | R6.7.26 | 陰性 |
| 890 | R6.7.16 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 10         | R6.7.26 | 陰性 |
| 891 | R6.7.20 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 35         | R6.7.26 | 陰性 |
| 892 | R6.7.19 | 世羅町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 43.4       | R6.7.26 | 陰性 |
| 893 | R6.7.21 | 世羅町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 85         | 30         | R6.7.26 | 陰性 |
| 894 | R6.7.19 | 熊野町   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 80         | 20         | R6.7.26 | 陰性 |
| 895 | R6.7.19 | 神石高原町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90～100     | 80～100     | R6.7.26 | 陰性 |
| 896 | R6.7.20 | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 115        | 90         | R6.7.30 | 陰性 |
| 897 | R6.7.23 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 30～35      | R6.7.30 | 陰性 |
| 898 | R6.7.19 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 57         | 2          | R6.7.30 | 陰性 |
| 899 | R6.7.25 | 庄原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 40         | R6.7.30 | 陰性 |
| 900 | R6.7.24 | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5          | R6.7.30 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日   | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|--------|----|
| 901 | R6.7.16 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 45         | R6.8.2 | 陰性 |
| 902 | R6.7.25 | 尾道市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60         | R6.8.2 | 陰性 |
| 903 | R6.7.26 | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5          | R6.8.2 | 陰性 |
| 904 | R6.7.28 | 東広島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60         | R6.8.2 | 陰性 |
| 905 | R6.7.19 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 10         | R6.8.2 | 陰性 |
| 906 | R6.7.23 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 10         | R6.8.2 | 陰性 |
| 907 | R6.7.23 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 60         | R6.8.2 | 陰性 |
| 908 | R6.7.24 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 50         | R6.8.2 | 陰性 |
| 909 | R6.7.26 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 120        | R6.8.2 | 陰性 |
| 910 | R6.7.25 | 熊野町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 70         | R6.8.2 | 陰性 |
| 911 | R6.7.27 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 65         | R6.8.2 | 陰性 |
| 912 | R6.7.28 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 50         | R6.8.2 | 陰性 |
| 913 | R6.7.23 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 15         | R6.8.2 | 陰性 |
| 914 | R6.7.29 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R6.8.2 | 陰性 |
| 915 | R6.7.31 | 神石高原町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 50         | R6.8.6 | 陰性 |
| 916 | R6.7.31 | 神石高原町 | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 20         | R6.8.6 | 陰性 |
| 917 | R6.7.29 | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 3          | R6.8.6 | 陽性 |
| 918 | R6.7.25 | 世羅町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 105        | 38         | R6.8.6 | 陰性 |
| 919 | R6.7.29 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 5.0        | R6.8.9 | 陰性 |
| 920 | R6.7.30 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 70.0       | R6.8.9 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 921 | R6.7.27 | 呉市    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 70.0       | R6.8.9  | 陰性 |
| 922 | R6.8.2  | 呉市    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60.0       | R6.8.9  | 陰性 |
| 923 | R6.8.3  | 呉市    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 50.0       | R6.8.9  | 陰性 |
| 924 | R6.8.2  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80～90      | 35～40      | R6.8.9  | 陰性 |
| 925 | R6.8.2  | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 30.0       | R6.8.9  | 陰性 |
| 926 | R6.8.3  | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 25.0       | R6.8.9  | 陰性 |
| 927 | R6.8.3  | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 75.0       | R6.8.9  | 陰性 |
| 928 | R6.7.30 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 102        | 40.2       | R6.8.23 | 陰性 |
| 929 | R6.8.5  | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 70.0       | R6.8.23 | 陰性 |
| 930 | R6.8.5  | 安芸太田町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 50.0       | R6.8.23 | 陰性 |
| 931 | R6.8.3  | 世羅町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 59.0       | R6.8.27 | 陰性 |
| 932 | R6.8.4  | 世羅町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 115        | 60.0       | R6.8.27 | 陰性 |
| 933 | R6.8.6  | 神石高原町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 50.0       | R6.8.27 | 陰性 |
| 934 | R6.8.7  | 神石高原町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 70.0       | R6.8.27 | 陰性 |
| 935 | R6.8.1  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 50.0       | R6.8.23 | 陽性 |
| 936 | R6.8.2  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 70.0       | R6.8.23 | 陰性 |
| 937 | R6.8.1  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 6.0        | R6.8.23 | 陰性 |
| 938 | R6.8.1  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 6.0        | R6.8.23 | 陰性 |
| 939 | R6.8.3  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 85         | 25.0       | R6.8.23 | 陰性 |
| 940 | R6.8.1  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 90         | 8.0        | R6.8.23 | 陽性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果   |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|------|
| 941 | R6.8.3  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 140        | 50.0       | R6.8.23 | 判定不能 |
| 942 | R6.8.1  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 25.0       | R6.8.23 | 陰性   |
| 943 | R6.8.5  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 30.0       | R6.8.23 | 陽性   |
| 944 | R6.8.5  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 10.0       | R6.8.23 | 陰性   |
| 945 | R6.8.1  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 10.0       | R6.8.23 | 陰性   |
| 946 | R6.8.6  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 90.0       | R6.8.23 | 陰性   |
| 947 | R6.8.5  | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 6.0        | R6.8.27 | 陰性   |
| 948 | R6.8.5  | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 7.0        | R6.8.27 | 陰性   |
| 949 | R6.8.6  | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50.0       | R6.8.27 | 陰性   |
| 950 | R6.8.6  | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 30.0       | R6.8.27 | 陰性   |
| 951 | R6.8.6  | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 40         | 30.0       | R6.8.27 | 陰性   |
| 952 | R6.8.8  | 神石高原町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 50.0       | R6.8.27 | 陰性   |
| 953 | R6.8.12 | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60.0       | R6.8.23 | 陰性   |
| 954 | R6.8.9  | 神石高原町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 15.0       | R6.8.27 | 陰性   |
| 955 | R6.8.10 | 神石高原町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 45         | 18.0       | R6.8.27 | 陰性   |
| 956 | R6.8.10 | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 16.0       | R6.8.27 | 陰性   |
| 957 | R6.8.11 | 神石高原町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 18.0       | R6.8.27 | 陰性   |
| 958 | R6.8.12 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 140        | 60.0       | R6.8.23 | 陰性   |
| 959 | R6.8.13 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 4.0        | R6.8.23 | 陰性   |
| 960 | R6.8.7  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 70.0       | R6.8.23 | 陰性   |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号  | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|-----|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 961 | R6.8.11 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5.0        | R6.8.23 | 陰性 |
| 962 | R6.8.13 | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 5.0        | R6.8.23 | 陰性 |
| 963 | R6.8.6  | 世羅町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 105        | 45.0       | R6.8.27 | 陰性 |
| 964 | R6.8.11 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 30.0       | R6.8.23 | 陰性 |
| 965 | R6.8.15 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 45.0       | R6.8.23 | 陰性 |
| 966 | R6.8.16 | 熊野町   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 7.0        | R6.8.23 | 陰性 |
| 967 | R6.8.17 | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40.0       | R6.8.23 | 陰性 |
| 968 | R6.8.7  | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 100        | R6.8.27 | 陰性 |
| 969 | R6.8.9  | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 80         | R6.8.27 | 陰性 |
| 970 | R6.8.11 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 40         | R6.8.27 | 陰性 |
| 971 | R6.8.12 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 100        | R6.8.27 | 陰性 |
| 972 | R6.8.12 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 40         | R6.8.27 | 陰性 |
| 973 | R6.8.14 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 60         | R6.8.27 | 陰性 |
| 974 | R6.8.13 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 15         | R6.8.27 | 陰性 |
| 975 | R6.8.16 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 20         | R6.8.27 | 陰性 |
| 976 | R6.8.20 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 30         | R6.8.27 | 陰性 |
| 977 | R6.8.9  | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 52         | 3          | R6.8.27 | 陰性 |
| 978 | R6.8.18 | 安芸太田町 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 15         | R6.8.27 | 陰性 |
| 979 | R6.8.19 | 安芸太田町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 20         | R6.8.27 | 陰性 |
| 980 | R6.8.19 | 安芸太田町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 19         | R6.8.27 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 981  | R6.8.19 | 東広島市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 7          | R6.8.27 | 陰性 |
| 982  | R6.8.20 | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 20         | R6.8.27 | 陰性 |
| 983  | R6.8.14 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 88         | 48         | R6.8.27 | 陰性 |
| 984  | R6.8.15 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 65         | 7          | R6.8.27 | 陰性 |
| 985  | R6.8.18 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 7          | R6.8.27 | 陰性 |
| 986  | R6.8.18 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 70         | R6.8.27 | 陰性 |
| 987  | R6.8.20 | 熊野町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 70         | R6.8.27 | 陰性 |
| 988  | R6.8.22 | 安芸太田町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 30         | R6.8.27 | 陰性 |
| 989  | R6.8.21 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 80         | R6.9.3  | 陰性 |
| 990  | R6.9.3  | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5          | R6.9.10 | 陰性 |
| 991  | R6.8.23 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 50         | R6.9.3  | 陰性 |
| 992  | R6.8.23 | 世羅町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 7.4        | R6.9.3  | 陰性 |
| 993  | R6.8.25 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 15         | R6.9.3  | 陽性 |
| 994  | R6.8.26 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 60         | R6.9.3  | 陰性 |
| 995  | R6.8.24 | 呉市    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60         | R6.9.6  | 陰性 |
| 996  | R6.8.26 | 呉市    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 80         | R6.9.6  | 陰性 |
| 997  | R6.8.22 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 20         | R6.9.6  | 陰性 |
| 998  | R6.8.23 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 150        | 90         | R6.9.6  | 陰性 |
| 999  | R6.8.24 | 安芸太田町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 25         | R6.9.6  | 陰性 |
| 1000 | R6.8.27 | 安芸太田町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 105        | 30         | R6.9.6  | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1001 | R6.8.22 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 2          | R6.9.6  | 陰性 |
| 1002 | R6.8.22 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 70         | R6.9.6  | 陰性 |
| 1003 | R6.8.24 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 20         | R6.9.6  | 陰性 |
| 1004 | R6.8.23 | 神石高原町 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 15         | R6.9.6  | 陽性 |
| 1005 | R6.8.24 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 61         | 5          | R6.9.6  | 陰性 |
| 1006 | R6.8.26 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 65         | 6.5        | R6.9.6  | 陰性 |
| 1007 | R6.9.2  | 庄原市   | 不明 | 死亡 | 成獣 | 70         | 10.0       | R6.9.6  | 陰性 |
| 1008 | R6.8.31 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60         | R6.9.10 | 陰性 |
| 1009 | R6.9.1  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 35         | R6.9.10 | 陰性 |
| 1010 | R6.9.1  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 150        | 80         | R6.9.10 | 陰性 |
| 1011 | R6.9.1  | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 62         | 10         | R6.9.10 | 陰性 |
| 1012 | R6.9.2  | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 65         | 30         | R6.9.10 | 陰性 |
| 1013 | R6.9.3  | 安芸太田町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 125        | 60         | R6.9.10 | 陰性 |
| 1014 | R6.8.31 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 28         | R6.9.13 | 陰性 |
| 1015 | R6.9.5  | 東広島市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 7          | R6.9.13 | 陰性 |
| 1016 | R6.9.5  | 熊野町   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 4          | R6.9.13 | 陰性 |
| 1017 | R6.9.7  | 熊野町   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 6          | R6.9.13 | 陰性 |
| 1018 | R6.9.9  | 大竹市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 60         | R6.9.13 | 陰性 |
| 1019 | R6.9.7  | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 18         | R6.9.20 | 陰性 |
| 1020 | R6.9.4  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 50         | R6.9.20 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1021 | R6.9.6  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 25         | R6.9.20 | 陰性 |
| 1022 | R6.9.7  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5          | R6.9.20 | 陰性 |
| 1023 | R6.9.6  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 40         | R6.9.20 | 陰性 |
| 1024 | R6.9.6  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40         | R6.9.20 | 陰性 |
| 1025 | R6.9.7  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 45         | R6.9.20 | 陰性 |
| 1026 | R6.9.9  | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 4          | R6.9.20 | 陰性 |
| 1027 | R6.9.7  | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40         | R6.9.20 | 陰性 |
| 1028 | R6.9.11 | 大竹市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 108        | 40         | R6.9.20 | 陰性 |
| 1029 | R6.9.11 | 世羅町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 125        | 72         | R6.9.20 | 陰性 |
| 1030 | R6.9.8  | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60         | R6.9.20 | 陰性 |
| 1031 | R6.9.14 | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40         | R6.9.20 | 陰性 |
| 1032 | R6.9.11 | 呉市    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R6.9.27 | 陰性 |
| 1033 | R6.9.12 | 呉市    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R6.9.27 | 陰性 |
| 1034 | R6.9.14 | 呉市    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R6.9.27 | 陰性 |
| 1035 | R6.9.17 | 大竹市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 25         | R6.9.27 | 陰性 |
| 1036 | R6.9.15 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 150        | 80         | R6.9.27 | 陰性 |
| 1037 | R6.9.9  | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 25         | R6.9.27 | 陰性 |
| 1038 | R6.9.10 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 15         | R6.9.27 | 陰性 |
| 1039 | R6.9.12 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 69         | 14.5       | R6.9.27 | 陰性 |
| 1040 | R6.9.12 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 67         | 13.5       | R6.9.27 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日     | 結果 |
|------|---------|-------|----|----|----|------------|------------|----------|----|
| 1041 | R6.9.10 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 65         | 10         | R6.9.27  | 陰性 |
| 1042 | R6.9.10 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 70         | R6.9.27  | 陽性 |
| 1043 | R6.9.11 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60         | R6.9.27  | 陰性 |
| 1044 | R6.9.18 | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 50         | R6.9.27  | 陰性 |
| 1045 | R6.9.16 | 熊野町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 50         | R6.9.27  | 陰性 |
| 1046 | R6.9.19 | 大竹市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 20         | R6.9.27  | 陰性 |
| 1047 | R6.9.14 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 118        | 67         | R6.9.27  | 陰性 |
| 1048 | R6.9.21 | 大竹市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 123        | 70         | R6.9.27  | 陰性 |
| 1049 | R6.9.19 | 熊野町   | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 3          | R6.9.27  | 陰性 |
| 1050 | R6.9.18 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 10         | R6.10.1  | 陽性 |
| 1051 | R6.9.19 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 53         | 2          | R6.10.1  | 陰性 |
| 1052 | R6.9.20 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 30         | R6.10.4  | 陰性 |
| 1053 | R6.9.24 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 140        | 30         | R6.10.4  | 陽性 |
| 1054 | R6.9.23 | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 40         | R6.10.4  | 陰性 |
| 1055 | R6.9.26 | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 30         | R6.10.4  | 陰性 |
| 1056 | R6.9.25 | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5          | R6.10.4  | 陰性 |
| 1057 | R6.9.24 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 150        | 70         | R6.10.4  | 陰性 |
| 1058 | R6.9.21 | 呉市    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40         | R6.10.8  | 陰性 |
| 1059 | R6.10.3 | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 20         | R6.10.11 | 陰性 |
| 1060 | R6.9.28 | 大崎上島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 40         | R6.10.11 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日     | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日     | 結果 |
|------|----------|-------|----|----|----|------------|------------|----------|----|
| 1061 | R6.10.4  | 北広島町  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40         | R6.10.11 | 陰性 |
| 1062 | R6.10.7  | 北広島町  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 30         | R6.10.11 | 陰性 |
| 1063 | R6.10.12 | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 15         | R6.10.18 | 陰性 |
| 1064 | R6.10.11 | 広島市   | 雄  | 死亡 | 成獣 | 100        | 60         | R6.10.18 | 陰性 |
| 1065 | R6.10.13 | 大崎上島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 45         | R6.10.29 | 陰性 |
| 1066 | R6.10.25 | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R6.11.1  | 陰性 |
| 1067 | R6.10.26 | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 30         | R6.11.1  | 陰性 |
| 1068 | R6.10.27 | 北広島町  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 30         | R6.11.8  | 陰性 |
| 1069 | R6.10.29 | 北広島町  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 30         | R6.11.8  | 陰性 |
| 1070 | R6.10.26 | 大崎上島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 60         | R6.11.8  | 陰性 |
| 1071 | R6.10.26 | 大崎上島町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 140        | 50         | R6.11.8  | 陰性 |
| 1072 | R6.11.7  | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 10         | R6.11.12 | 陰性 |
| 1073 | R6.11.9  | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 30         | R6.11.15 | 陰性 |
| 1074 | R6.11.7  | 大崎上島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 135        | 80         | R6.11.19 | 陰性 |
| 1075 | R6.11.7  | 大崎上島町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 40         | R6.11.19 | 陰性 |
| 1076 | R6.11.8  | 大崎上島町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 50         | R6.11.19 | 陰性 |
| 1077 | R6.11.9  | 大崎上島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 45         | R6.11.19 | 陰性 |
| 1078 | R6.11.11 | 大崎上島町 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 15         | R6.11.19 | 陰性 |
| 1079 | R6.11.12 | 大崎上島町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 50         | R6.11.19 | 陰性 |
| 1080 | R6.11.11 | 熊野町   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 23         | R6.11.19 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日     | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日     | 結果 |
|------|----------|------|----|----|----|------------|------------|----------|----|
| 1081 | R6.11.12 | 府中市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 10         | R6.11.19 | 陰性 |
| 1082 | R6.11.14 | 江田島市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 30         | R6.11.22 | 陰性 |
| 1083 | R6.11.10 | 北広島町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 40         | R6.11.22 | 陰性 |
| 1084 | R6.11.10 | 北広島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 35         | R6.11.22 | 陰性 |
| 1085 | R6.11.23 | 府中市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 10         | R6.11.29 | 陰性 |
| 1086 | R6.12.14 | 熊野町  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 70         | R6.12.20 | 陰性 |
| 1087 | R6.12.25 | 熊野町  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 25         | R7.1.10  | 陰性 |
| 1088 | R7.1.17  | 熊野町  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 30         | R7.1.28  | 陰性 |
| 1089 | R7.1.24  | 江田島市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 20         | R7.1.31  | 陽性 |
| 1090 | R7.2.1   | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 100        | R7.2.7   | 陰性 |
| 1091 | R7.2.2   | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 60         | R7.2.7   | 陽性 |
| 1092 | R7.2.1   | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 150        | 100        | R7.2.7   | 陰性 |
| 1093 | R7.2.2   | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 150        | 60         | R7.2.7   | 陰性 |
| 1094 | R7.2.4   | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 65         | R7.2.14  | 陰性 |
| 1095 | R7.2.15  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 65         | R7.2.28  | 陰性 |
| 1096 | R7.2.15  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 30         | R7.2.28  | 陰性 |
| 1097 | R7.2.17  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40         | R7.2.28  | 陰性 |
| 1098 | R7.2.22  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 80         | R7.3.4   | 陰性 |
| 1099 | R7.2.26  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 20         | R7.3.4   | 陰性 |
| 1100 | R7.2.27  | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 10         | R7.3.4   | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日    | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|---------|------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1101 | R7.4.20 | 尾道市  | 雌  | 死亡 | 成獣 | 120        | 60         | R7.4.25 | 陽性 |
| 1102 | R7.6.9  | 江田島市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 25         | R7.6.17 | 陰性 |
| 1103 | R7.6.8  | 尾道市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 45         | R7.6.17 | 陰性 |
| 1104 | R7.6.8  | 尾道市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 70         | R7.6.17 | 陰性 |
| 1105 | R7.6.8  | 尾道市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 30         | R7.6.17 | 陰性 |
| 1106 | R7.6.12 | 江田島市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 70         | R7.6.20 | 陰性 |
| 1107 | R7.6.12 | 北広島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 98         | 50         | R7.6.20 | 陰性 |
| 1108 | R7.6.11 | 世羅町  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 65         | R7.6.20 | 陰性 |
| 1109 | R7.6.11 | 世羅町  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 48.5       | R7.6.20 | 陰性 |
| 1110 | R7.6.6  | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 36         | R7.6.20 | 陰性 |
| 1111 | R7.6.9  | 坂町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 97         | 31         | R7.6.20 | 陰性 |
| 1112 | R7.6.10 | 坂町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 25         | R7.6.20 | 陰性 |
| 1113 | R7.6.14 | 江田島市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 40         | R7.6.20 | 陰性 |
| 1114 | R7.6.14 | 北広島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 95         | 50         | R7.6.20 | 陰性 |
| 1115 | R7.6.17 | 世羅町  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 35.2       | R7.6.24 | 陰性 |
| 1116 | R7.6.16 | 東広島市 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 30         | R7.6.24 | 陰性 |
| 1117 | R7.6.17 | 府中市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 30         | R7.6.24 | 陰性 |
| 1118 | R7.6.15 | 尾道市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 40         | R7.6.24 | 陰性 |
| 1119 | R7.6.21 | 江田島市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 30         | R7.6.27 | 陰性 |
| 1120 | R7.6.21 | 東広島市 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 25         | R7.6.27 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日    | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|---------|------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1121 | R7.6.14 | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 75         | 24         | R7.6.27 | 陰性 |
| 1122 | R7.6.21 | 竹原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 80         | R7.6.27 | 陰性 |
| 1123 | R7.6.22 | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 150        | 100        | R7.6.27 | 陰性 |
| 1124 | R7.6.25 | 世羅町  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 29         | R7.7.1  | 陰性 |
| 1125 | R7.6.24 | 東広島市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 70         | R7.7.1  | 陰性 |
| 1126 | R7.6.25 | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 75         | 20         | R7.7.8  | 陰性 |
| 1127 | R7.7.1  | 尾道市  | 雌  | 死亡 | 成獣 | 100        | 30         | R7.7.8  | 陰性 |
| 1128 | R7.7.1  | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 25         | R7.7.8  | 陰性 |
| 1129 | R7.6.24 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 35         | R7.7.8  | 陰性 |
| 1130 | R7.6.24 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60         | R7.7.8  | 陰性 |
| 1131 | R7.6.25 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 1          | R7.7.8  | 陰性 |
| 1132 | R7.6.27 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 70         | R7.7.8  | 陰性 |
| 1133 | R7.6.27 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 30         | R7.7.8  | 陰性 |
| 1134 | R7.6.29 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 30         | R7.7.8  | 陰性 |
| 1135 | R7.6.30 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R7.7.8  | 陰性 |
| 1136 | R7.7.1  | 世羅町  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 61.3       | R7.7.8  | 陰性 |
| 1137 | R7.6.30 | 熊野町  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 45         | 28         | R7.7.8  | 陰性 |
| 1138 | R7.7.2  | 府中市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 65         | 30         | R7.7.8  | 陰性 |
| 1139 | R7.6.30 | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 95         | 35         | R7.7.11 | 陰性 |
| 1140 | R7.7.5  | 江田島市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 40         | R7.7.11 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1141 | R7.6.30 | 北広島町  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 50         | R7.7.11 | 陰性 |
| 1142 | R7.7.7  | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 60         | R7.7.11 | 陰性 |
| 1143 | R7.7.9  | 世羅町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 61.4       | R7.7.15 | 陰性 |
| 1144 | R7.7.8  | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 60         | R7.7.15 | 陰性 |
| 1145 | R7.7.2  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 30         | R7.7.15 | 陰性 |
| 1146 | R7.7.4  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 25         | R7.7.15 | 陰性 |
| 1147 | R7.7.4  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 3          | R7.7.15 | 陰性 |
| 1148 | R7.7.5  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 1.2        | R7.7.15 | 陰性 |
| 1149 | R7.7.7  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 50         | R7.7.15 | 陰性 |
| 1150 | R7.7.9  | 尾道市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 20         | R7.7.15 | 陰性 |
| 1151 | R7.7.10 | 世羅町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 72.5       | R7.7.15 | 陰性 |
| 1152 | R7.7.7  | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 35         | R7.7.15 | 陰性 |
| 1153 | R7.7.13 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 30         | R7.7.18 | 陰性 |
| 1154 | R7.7.10 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 50         | R7.7.18 | 陰性 |
| 1155 | R7.7.12 | 世羅町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 105        | 41.8       | R7.7.18 | 陰性 |
| 1156 | R7.7.12 | 世羅町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 57.8       | R7.7.18 | 陰性 |
| 1157 | R7.7.13 | 東広島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60         | R7.7.18 | 陰性 |
| 1158 | R7.7.14 | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R7.7.18 | 陰性 |
| 1159 | R7.7.15 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 95         | 25         | R7.7.18 | 陰性 |
| 1160 | R7.7.9  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 30         | 10         | R7.7.25 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1161 | R7.7.11 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 10         | R7.7.25 | 陰性 |
| 1162 | R7.7.16 | 安芸太田町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 20         | R7.7.25 | 陰性 |
| 1163 | R7.7.17 | 尾道市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 40         | R7.7.25 | 陰性 |
| 1164 | R7.7.17 | 世羅町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 39.8       | R7.7.25 | 陰性 |
| 1165 | R7.7.17 | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 60         | R7.7.29 | 陰性 |
| 1166 | R7.7.18 | 呉市    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 50         | R7.7.29 | 陰性 |
| 1167 | R7.7.19 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 40         | R7.7.29 | 陰性 |
| 1168 | R7.7.21 | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 4          | R7.7.29 | 陰性 |
| 1169 | R7.7.14 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 125        | 70         | R7.7.29 | 陰性 |
| 1170 | R7.7.19 | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 40         | R7.7.29 | 陰性 |
| 1171 | R7.7.19 | 廿日市市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 30         | R7.7.29 | 陰性 |
| 1172 | R7.7.21 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40         | R7.7.29 | 陰性 |
| 1173 | R7.7.22 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 42         | R7.7.29 | 陰性 |
| 1174 | R7.7.22 | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 50         | R7.7.29 | 陰性 |
| 1175 | R7.7.23 | 世羅町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 105        | 47.5       | R7.7.29 | 陰性 |
| 1176 | R7.7.21 | 熊野町   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 7          | R7.7.29 | 陰性 |
| 1177 | R7.7.22 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 20         | 1          | R7.7.29 | 陰性 |
| 1178 | R7.7.14 | 尾道市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 30         | R7.7.29 | 陰性 |
| 1179 | R7.7.19 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 20         | 1          | R7.7.29 | 陰性 |
| 1180 | R7.7.23 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 30         | R7.7.29 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1181 | R7.7.24 | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50         | R7.7.29 | 陰性 |
| 1182 | R7.7.24 | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60         | R7.7.29 | 陰性 |
| 1183 | R7.7.18 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 30         | R7.7.29 | 陰性 |
| 1184 | R7.7.21 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 45         | R7.7.29 | 陰性 |
| 1185 | R7.7.22 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 15         | R7.7.29 | 陰性 |
| 1186 | R7.7.21 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 50         | R7.8.1  | 陽性 |
| 1187 | R7.7.24 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 40         | R7.8.1  | 陰性 |
| 1188 | R7.7.24 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 8          | R7.8.1  | 陰性 |
| 1189 | R7.7.25 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 1          | R7.8.1  | 陰性 |
| 1190 | R7.7.19 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 4          | R7.8.1  | 陰性 |
| 1191 | R7.7.21 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 29.4       | R7.8.1  | 陰性 |
| 1192 | R7.7.22 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 5          | R7.8.1  | 陰性 |
| 1193 | R7.7.23 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 5.4        | R7.8.1  | 陰性 |
| 1194 | R7.7.26 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 45         | R7.8.1  | 陰性 |
| 1195 | R7.7.28 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 20～25      | R7.8.1  | 陰性 |
| 1196 | R7.7.26 | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 6          | R7.8.1  | 陰性 |
| 1197 | R7.7.26 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 10         | R7.8.1  | 陰性 |
| 1198 | R7.7.25 | 呉市    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60         | R7.8.1  | 陰性 |
| 1199 | R7.7.24 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 35         | R7.8.1  | 陰性 |
| 1200 | R7.7.25 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 53         | 5          | R7.8.1  | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日   | 結果 |
|------|---------|-------|----|----|----|------------|------------|--------|----|
| 1201 | R7.7.28 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 4.6        | R7.8.1 | 陰性 |
| 1202 | R7.7.26 | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 115        | 40         | R7.8.1 | 陰性 |
| 1203 | R7.7.28 | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5          | R7.8.1 | 陰性 |
| 1204 | R7.7.28 | 世羅町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 45         | R7.8.1 | 陰性 |
| 1205 | R7.7.28 | 呉市    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 70         | R7.8.1 | 陰性 |
| 1206 | R7.7.29 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40.0       | R7.8.5 | 陰性 |
| 1207 | R7.7.30 | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5.0        | R7.8.5 | 陰性 |
| 1208 | R7.7.29 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 50.0       | R7.8.5 | 陰性 |
| 1209 | R7.7.29 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60.0       | R7.8.5 | 陰性 |
| 1210 | R7.7.27 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 30.0       | R7.8.5 | 陰性 |
| 1211 | R7.7.30 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 25.0       | R7.8.5 | 陰性 |
| 1212 | R7.7.25 | 廿日市市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 20.0       | R7.8.5 | 陰性 |
| 1213 | R7.7.31 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 10.0       | R7.8.5 | 陰性 |
| 1214 | R7.7.31 | 江田島市  | 雌  | 死亡 | 成獣 | 100        | 50.0       | R7.8.5 | 陰性 |
| 1215 | R7.7.30 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 10.0       | R7.8.8 | 陰性 |
| 1216 | R7.7.30 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 30.0       | R7.8.8 | 陰性 |
| 1217 | R7.7.30 | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 7.0        | R7.8.8 | 陰性 |
| 1218 | R7.7.30 | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 4.0        | R7.8.8 | 陰性 |
| 1219 | R7.8.1  | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 55.0       | R7.8.8 | 陰性 |
| 1220 | R7.8.1  | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 30.0       | R7.8.8 | 陰性 |
| 1221 | R7.7.31 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5.0        | R7.8.8 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日    | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|---------|------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1222 | R7.8.1  | 府中市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 45         | 4.0        | R7.8.8  | 陰性 |
| 1223 | R7.8.1  | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 25.0       | R7.8.8  | 陰性 |
| 1224 | R7.8.1  | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50.0       | R7.8.8  | 陰性 |
| 1225 | R7.8.3  | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 20.0       | R7.8.8  | 陰性 |
| 1226 | R7.8.1  | 竹原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 75         | 45.0       | R7.8.8  | 陰性 |
| 1227 | R7.8.2  | 竹原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 100.0      | R7.8.8  | 陰性 |
| 1228 | R7.8.3  | 竹原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 130.0      | R7.8.8  | 陰性 |
| 1229 | R7.8.4  | 竹原市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 2.0        | R7.8.8  | 陰性 |
| 1230 | R7.8.1  | 呉市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 70.0       | R7.8.8  | 陰性 |
| 1231 | R7.8.1  | 呉市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 80.0       | R7.8.8  | 陰性 |
| 1232 | R7.8.2  | 呉市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60.0       | R7.8.8  | 陰性 |
| 1233 | R7.7.30 | 尾道市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 90.0       | R7.8.8  | 陰性 |
| 1234 | R7.7.31 | 尾道市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 70.0       | R7.8.8  | 陰性 |
| 1235 | R7.8.5  | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 15.0       | R7.8.8  | 陰性 |
| 1236 | R7.7.29 | 坂町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 115        | 51.0       | R7.8.8  | 陰性 |
| 1237 | R7.7.30 | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 95         | 28.0       | R7.8.8  | 陰性 |
| 1238 | R7.7.31 | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 不明         | 不明         | R7.8.8  | 陰性 |
| 1239 | R7.7.31 | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 不明         | 不明         | R7.8.8  | 陰性 |
| 1240 | R7.8.2  | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 不明         | 不明         | R7.8.8  | 陰性 |
| 1241 | R7.8.4  | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 不明         | 不明         | R7.8.8  | 陰性 |
| 1242 | R7.8.5  | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 50.0       | R7.8.22 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1243 | R7.8.5  | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 140        | 50.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1244 | R7.8.6  | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 30.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1245 | R7.8.5  | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 4.0        | R7.8.22 | 陰性 |
| 1246 | R7.8.6  | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 20.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1247 | R7.8.2  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 90         | 12.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1248 | R7.8.2  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 6.0        | R7.8.22 | 陰性 |
| 1249 | R7.8.3  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 80         | 10.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1250 | R7.8.5  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1251 | R7.8.5  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 35         | 6.0        | R7.8.22 | 陰性 |
| 1252 | R7.7.26 | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 70.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1253 | R7.8.6  | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 40.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1254 | R7.8.6  | 世羅町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 42.2       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1255 | R7.8.5  | 呉市    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 70.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1256 | R7.8.6  | 呉市    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 60.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1257 | R7.8.7  | 大竹市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 20.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1258 | R7.8.7  | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 55.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1259 | R7.8.7  | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 40.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1260 | R7.8.8  | 世羅町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 105        | 49.7       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1261 | R7.8.9  | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 60.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1262 | R7.8.10 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 100.0      | R7.8.22 | 陰性 |
| 1263 | R7.8.10 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 85         | 30.0       | R7.8.22 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日    | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|---------|------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1264 | R7.8.10 | 江田島市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 60.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1265 | R7.8.7  | 江田島市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 40.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1266 | R7.8.3  | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 3.5        | R7.8.22 | 陰性 |
| 1267 | R7.8.4  | 坂町   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 65         | 5.0        | R7.8.22 | 陰性 |
| 1268 | R7.8.4  | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 95         | 31.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1269 | R7.8.7  | 坂町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 40.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1270 | R7.8.11 | 江田島市 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5.0        | R7.8.22 | 陰性 |
| 1271 | R7.8.7  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1272 | R7.8.7  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1273 | R7.8.8  | 尾道市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1274 | R7.8.7  | 尾道市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 40.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1275 | R7.8.12 | 熊野町  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 35.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1276 | R7.8.12 | 府中市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 35.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1277 | R7.8.12 | 江田島市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 40.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1278 | R7.8.7  | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 95         | 33.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1279 | R7.8.9  | 坂町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 98         | 31.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1280 | R7.8.10 | 坂町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 49.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1281 | R7.8.11 | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 115        | 65.0       | R7.8.22 | 陰性 |
| 1282 | R7.8.12 | 竹原市  | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 6.0        | R7.8.26 | 陰性 |
| 1283 | R7.8.16 | 江田島市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 80.0       | R7.8.26 | 陰性 |
| 1284 | R7.8.17 | 江田島市 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 5.0        | R7.8.26 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1285 | R7.8.16 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 70.0       | R7.8.26 | 陰性 |
| 1286 | R7.8.17 | 大竹市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 50.0       | R7.8.26 | 陰性 |
| 1287 | R7.8.15 | 世羅町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 45.3       | R7.8.26 | 陰性 |
| 1288 | R7.8.18 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 1.0        | R7.8.26 | 陰性 |
| 1289 | R7.8.18 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 1.0        | R7.8.26 | 陰性 |
| 1290 | R7.8.10 | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 14.0       | R7.8.26 | 陰性 |
| 1291 | R7.8.18 | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 45.0       | R7.8.26 | 陰性 |
| 1292 | R7.8.19 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 4.0        | R7.8.26 | 陰性 |
| 1293 | R7.8.19 | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5.0        | R7.8.26 | 陰性 |
| 1294 | R7.8.20 | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5.0        | R7.8.26 | 陰性 |
| 1295 | R7.8.20 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 30.0       | R7.8.26 | 陰性 |
| 1296 | R7.8.20 | 呉市    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 60.0       | R7.8.29 | 陰性 |
| 1297 | R7.8.21 | 廿日市市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 3.0        | R7.8.29 | 陰性 |
| 1298 | R7.8.19 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 60.0       | R7.8.29 | 陰性 |
| 1299 | R7.8.21 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 65         | 1.0        | R7.8.29 | 陰性 |
| 1300 | R7.8.22 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 65         | 1.0        | R7.8.29 | 陰性 |
| 1301 | R7.8.24 | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 5.0        | R7.8.29 | 陰性 |
| 1302 | R7.8.22 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 30.0       | R7.8.29 | 陰性 |
| 1303 | R7.8.24 | 竹原市   | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 10.0       | R7.8.29 | 陰性 |
| 1304 | R7.8.25 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 20.0       | R7.8.29 | 陰性 |
| 1305 | R7.8.23 | 呉市    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 70.0       | R7.8.29 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1306 | R7.8.22 | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 1.0        | R7.8.29 | 陰性 |
| 1307 | R7.8.26 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 5.0        | R7.9.2  | 陰性 |
| 1308 | R7.8.21 | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 30.0       | R7.9.2  | 陰性 |
| 1309 | R7.8.25 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 60.0       | R7.9.2  | 陰性 |
| 1310 | R7.8.26 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 100.0      | R7.9.2  | 陰性 |
| 1311 | R7.8.25 | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 35.0       | R7.9.2  | 陰性 |
| 1312 | R7.8.26 | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 60.0       | R7.9.2  | 陰性 |
| 1313 | R7.8.26 | 廿日市市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 10.0       | R7.9.2  | 陰性 |
| 1314 | R7.8.26 | 呉市    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 50.0       | R7.9.2  | 陰性 |
| 1315 | R7.8.27 | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5.0        | R7.9.5  | 陰性 |
| 1316 | R7.8.26 | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 15.0       | R7.9.5  | 陰性 |
| 1317 | R7.8.28 | 東広島市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 6.0        | R7.9.5  | 陰性 |
| 1318 | R7.8.27 | 世羅町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 95         | 39.0       | R7.9.5  | 陰性 |
| 1319 | R7.8.27 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 140        | 90.0       | R7.9.5  | 陰性 |
| 1320 | R7.8.29 | 大竹市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 30.0       | R7.9.5  | 陰性 |
| 1321 | R7.8.30 | 大竹市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 25.0       | R7.9.5  | 陰性 |
| 1322 | R7.8.30 | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40.0       | R7.9.5  | 陰性 |
| 1323 | R7.9.1  | 世羅町   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 100        | 42.8       | R7.9.5  | 陰性 |
| 1324 | R7.9.1  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 40.0       | R7.9.5  | 陰性 |
| 1325 | R7.9.1  | 大竹市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5.0        | R7.9.5  | 陰性 |
| 1326 | R7.8.31 | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 25.0       | R7.9.9  | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日    | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|---------|------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1327 | R7.9.1  | 熊野町  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 65         | 97.0       | R7.9.9  | 陰性 |
| 1328 | R7.9.2  | 江田島市 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 5.0        | R7.9.9  | 陰性 |
| 1329 | R7.9.1  | 呉市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 40.0       | R7.9.9  | 陰性 |
| 1330 | R7.9.3  | 大竹市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 15.0       | R7.9.9  | 陰性 |
| 1331 | R7.9.1  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 15.0       | R7.9.9  | 陰性 |
| 1332 | R7.9.1  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 15.0       | R7.9.9  | 陰性 |
| 1333 | R7.9.1  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 30.0       | R7.9.9  | 陰性 |
| 1334 | R7.9.1  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 6.0        | R7.9.9  | 陰性 |
| 1335 | R7.9.1  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 35.0       | R7.9.9  | 陰性 |
| 1336 | R7.9.3  | 尾道市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 77.5       | R7.9.9  | 陰性 |
| 1337 | R7.9.3  | 尾道市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40.0       | R7.9.9  | 陰性 |
| 1338 | R7.9.1  | 尾道市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 30.0       | R7.9.9  | 陰性 |
| 1339 | R7.9.5  | 東広島市 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 6.0        | R7.9.12 | 陰性 |
| 1340 | R7.9.5  | 東広島市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 50.0       | R7.9.12 | 陰性 |
| 1341 | R7.9.6  | 東広島市 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 25.0       | R7.9.12 | 陰性 |
| 1342 | R7.8.29 | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 5.8        | R7.9.12 | 陰性 |
| 1343 | R7.8.30 | 坂町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 41.0       | R7.9.12 | 陰性 |
| 1344 | R7.9.1  | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 95         | 31.0       | R7.9.12 | 陰性 |
| 1345 | R7.9.3  | 坂町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 75         | 10.5       | R7.9.12 | 陰性 |
| 1346 | R7.9.3  | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 6.0        | R7.9.12 | 陰性 |
| 1347 | R7.9.5  | 世羅町  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 125        | 107.3      | R7.9.12 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日     | 結果 |
|------|---------|-------|----|----|----|------------|------------|----------|----|
| 1348 | R7.9.8  | 大竹市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5.0        | R7.9.12  | 陰性 |
| 1349 | R7.9.7  | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 50.0       | R7.9.12  | 陰性 |
| 1350 | R7.9.7  | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 70.0       | R7.9.12  | 陰性 |
| 1351 | R7.9.4  | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 90.0       | R7.9.12  | 陰性 |
| 1352 | R7.9.9  | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 10.0       | R7.9.12  | 陰性 |
| 1353 | R7.9.9  | 東広島市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 30.0       | R7.9.12  | 陰性 |
| 1354 | R7.9.7  | 尾道市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 20.0       | R7.9.12  | 陰性 |
| 1355 | R7.9.9  | 大竹市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50.0       | R7.9.12  | 陰性 |
| 1356 | R7.9.8  | 呉市    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40.0       | R7.9.19  | 陰性 |
| 1357 | R7.9.3  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60.0       | R7.9.19  | 陰性 |
| 1358 | R7.9.12 | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 40.0       | R7.9.19  | 陰性 |
| 1359 | R7.9.6  | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 65         | 10.0       | R7.9.19  | 陰性 |
| 1360 | R7.9.8  | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 10.8       | R7.9.19  | 陰性 |
| 1361 | R7.9.9  | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 97         | 33.0       | R7.9.19  | 陰性 |
| 1362 | R7.9.11 | 世羅町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 95         | 42.6       | R7.9.26  | 陰性 |
| 1363 | R7.9.16 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 6.0        | R7.9.26  | 陰性 |
| 1364 | R7.9.18 | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 30.0       | R7.9.26  | 陰性 |
| 1365 | R7.10.4 | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 80         | 10.0       | R7.10.10 | 陰性 |
| 1366 | R7.10.1 | 尾道市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 30.0       | R7.10.10 | 陰性 |
| 1367 | R7.10.4 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 10.0       | R7.10.10 | 陰性 |
| 1368 | R7.10.6 | 尾道市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 15.0       | R7.10.17 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日     | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日     | 結果 |
|------|----------|------|----|----|----|------------|------------|----------|----|
| 1369 | R7.10.9  | 江田島市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 40.0       | R7.10.17 | 陰性 |
| 1370 | R7.10.12 | 尾道市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 80.0       | R7.10.21 | 陰性 |
| 1371 | R7.10.14 | 尾道市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 20.0       | R7.10.21 | 陰性 |
| 1372 | R7.10.9  | 江田島市 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 6.0        | R7.10.21 | 陰性 |
| 1373 | R7.10.9  | 江田島市 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5.0        | R7.10.21 | 陰性 |
| 1374 | R7.10.21 | 廿日市市 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 80         | 15.0       | R7.10.28 | 陰性 |
| 1375 | R7.10.26 | 尾道市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 75         | 30.0       | R7.10.31 | 陰性 |
| 1376 | R7.10.28 | 尾道市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 70.0       | R7.10.31 | 陰性 |
| 1377 | R7.11.8  | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 20.0       | R7.11.14 | 陰性 |
| 1378 | R7.11.8  | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 40.0       | R7.11.14 | 陰性 |
| 1379 | R7.11.9  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40.0       | R7.11.18 | 陰性 |
| 1380 | R7.11.10 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 10.0       | R7.11.18 | 陰性 |
| 1381 | R7.11.12 | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 20.0       | R7.11.21 | 陰性 |
| 1382 | R7.11.12 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 45.0       | R7.11.21 | 陰性 |
| 1383 | R7.11.13 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 25.0       | R7.11.21 | 陰性 |
| 1384 | R7.11.17 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 95         | 30.0       | R7.11.21 | 陰性 |
| 1385 | R7.11.17 | 廿日市市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 30.0       | R7.11.21 | 陰性 |
| 1386 | R7.11.15 | 江田島市 | 雌  | 死亡 | 成獣 | 70         | 15.0       | R7.11.21 | 陰性 |
| 1387 | R7.11.20 | 熊野町  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 70.0       | R7.11.28 | 陰性 |
| 1388 | R7.11.22 | 熊野町  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 105.0      | R7.11.28 | 陰性 |
| 1389 | R7.11.22 | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 65         | 35.0       | R7.11.28 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日     | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日     | 結果 |
|------|----------|------|----|----|----|------------|------------|----------|----|
| 1390 | R7.11.21 | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 30.0       | R7.11.28 | 陰性 |
| 1391 | R7.11.21 | 廿日市市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60.0       | R7.11.28 | 陰性 |
| 1392 | R7.11.24 | 廿日市市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 30.0       | R7.11.28 | 陰性 |
| 1393 | R7.11.24 | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 25.0       | R7.12.5  | 陰性 |
| 1394 | R7.11.30 | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 60.0       | R7.12.5  | 陰性 |
| 1395 | R7.12.4  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 25.0       | R7.12.16 | 陰性 |
| 1396 | R8.1.4   | 江田島市 | 雌  | 死亡 | 成獣 | 120        | 70.0       | R8.1.9   | 陰性 |
| 1397 | R8.1.7   | 江田島市 | 雌  | 死亡 | 成獣 | 80         | 30.0       | R8.1.9   | 陰性 |
| 1398 | R8.1.10  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 18.0       | R8.1.20  | 陰性 |
| 1399 | R8.1.12  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 45.0       | R8.1.20  | 陰性 |
| 1400 | R8.1.11  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 65         | 17.0       | R8.1.20  | 陰性 |
| 1401 | R8.1.11  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 70.0       | R8.1.20  | 陰性 |
| 1402 | R8.1.21  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 135        | 45.0       | R8.2.17  | 陰性 |
| 1403 | R8.2.7   | 江田島市 | 雄  | 死亡 | 成獣 | 130        | 80.0       | R8.2.19  | 陰性 |
| 1404 | R8.2.17  | 尾道市  | 雄  | 死亡 | 成獣 | 90         | 30.0       | R8.2.19  | 陰性 |
| 1405 | R8.2.17  | 福山市  | 雄  | 死亡 | 成獣 | 100        |            | R8.2.27  | 陰性 |
| 1406 | R8.2.23  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 60.0       | R8.2.27  | 陰性 |
| 1407 | R8.2.20  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 60.0       | R8.3.3   | 陰性 |
| 1408 | R8.2.20  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 60.0       | R8.3.3   | 陰性 |
| 1409 | R8.2.21  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 70.0       | R8.3.3   | 陰性 |
| 1410 | R8.2.23  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 55.0       | R8.3.3   | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1411 | R8.4.20 | 大竹市   | 雌  | 死亡 | 成獣 | 100        | 30.0       | R8.4.30 | 陰性 |
| 1412 | R8.5.8  | 江田島市  | 雄  | 死亡 | 成獣 | 80         | 30.0       | R8.5.14 | 陰性 |
| 1413 | R8.6.14 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50.0       | R8.6.25 | 陰性 |
| 1414 | R8.6.15 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50.0       | R8.6.25 | 陰性 |
| 1415 | R8.6.16 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 20.0       | R8.6.25 | 陰性 |
| 1416 | R8.6.15 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 92         | 33.0       | R8.6.25 | 陰性 |
| 1417 | R8.6.16 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 101        | 46.0       | R8.6.25 | 陰性 |
| 1418 | R8.6.19 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 30.0       | R8.6.25 | 陰性 |
| 1419 | R8.6.19 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 35.0       | R8.6.25 | 陰性 |
| 1420 | R8.6.20 | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5.0        | R8.6.25 | 陰性 |
| 1421 | R8.6.19 | 江田島市  | 雄  | 死亡 | 幼獣 | 50         | 5.0        | R8.6.25 | 陰性 |
| 1422 | R8.6.19 | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 30.0       | R8.7.2  | 陰性 |
| 1423 | R8.6.21 | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50.0       | R8.7.2  | 陰性 |
| 1424 | R8.6.22 | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 65.0       | R8.7.2  | 陰性 |
| 1425 | R8.6.21 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 7.0        | R8.7.2  | 陰性 |
| 1426 | R8.6.21 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 20.0       | R8.7.2  | 陰性 |
| 1427 | R8.6.17 | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 30.0       | R8.7.2  | 陰性 |
| 1428 | R8.6.22 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40.0       | R8.7.2  | 陰性 |
| 1429 | R8.6.18 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 99         | 41.0       | R8.7.2  | 陰性 |
| 1430 | R8.6.24 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 36.0       | R8.7.2  | 陰性 |
| 1431 | R8.6.21 | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 53.0       | R8.7.2  | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1432 | R8.6.21 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 69.0       | R8.7.2  | 陰性 |
| 1433 | R8.6.25 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 40.0       | R8.7.9  | 陰性 |
| 1434 | R8.6.26 | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 25.0       | R8.7.9  | 陰性 |
| 1435 | R8.6.28 | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 30.0       | R8.7.9  | 陰性 |
| 1436 | R8.6.27 | 呉市    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 30.0       | R8.7.9  | 陰性 |
| 1437 | R8.6.26 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 92         | 32.0       | R8.7.9  | 陰性 |
| 1438 | R8.6.26 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 92         | 33.0       | R8.7.9  | 陰性 |
| 1439 | R8.6.27 | 世羅町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 68         | 15.0       | R8.7.9  | 陰性 |
| 1440 | R8.6.28 | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 20.0       | R8.7.9  | 陰性 |
| 1441 | R8.6.29 | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 45.0       | R8.7.9  | 陰性 |
| 1442 | R8.6.30 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 50.0       | R8.7.9  | 陰性 |
| 1443 | R8.7.1  | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 54.0       | R8.7.9  | 陰性 |
| 1444 | R8.7.1  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 10.0       | R8.7.9  | 陰性 |
| 1445 | R8.7.2  | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 4.0        | R8.7.9  | 陰性 |
| 1446 | R8.7.3  | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 30.0       | R8.7.9  | 陰性 |
| 1447 | R8.7.5  | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 80.0       | R8.7.9  | 陰性 |
| 1448 | R8.7.4  | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 6.0        | R8.7.9  | 陰性 |
| 1449 | R8.7.3  | 呉市    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 60.0       | R8.7.16 | 陰性 |
| 1450 | R8.7.1  | 世羅町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 96.1       | R8.7.16 | 陰性 |
| 1451 | R8.7.3  | 世羅町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 36.1       | R8.7.16 | 陰性 |
| 1452 | R8.7.7  | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 80.0       | R8.7.16 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1453 | R8.7.6  | 呉市    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 60.0       | R8.7.16 | 陰性 |
| 1454 | R8.7.3  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 8.0        | R8.7.16 | 陰性 |
| 1455 | R8.7.5  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 1.5        | R8.7.16 | 陰性 |
| 1456 | R8.7.6  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 50.0       | R8.7.16 | 陰性 |
| 1457 | R8.7.6  | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 35.0       | R8.7.16 | 陰性 |
| 1458 | R8.7.4  | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 40.0       | R8.7.16 | 陰性 |
| 1459 | R8.7.7  | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 3.0        | R8.7.16 | 陰性 |
| 1460 | R8.7.7  | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5.0        | R8.7.16 | 陰性 |
| 1461 | R8.7.8  | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 35.0       | R8.7.16 | 陰性 |
| 1462 | R8.7.7  | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 25.0       | R8.7.16 | 陰性 |
| 1463 | R8.7.6  | 坂町    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 25.0       | R8.7.16 | 陰性 |
| 1464 | R8.7.8  | 三原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 25.0       | R8.7.16 | 陰性 |
| 1465 | R8.7.9  | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 122        | 50.0       | R8.7.16 | 陰性 |
| 1466 | R8.7.11 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 35.0       | R8.7.16 | 陰性 |
| 1467 | R8.7.10 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 93         | 25.0       | R8.7.16 | 陰性 |
| 1468 | R8.7.10 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 94         | 30.0       | R8.7.16 | 陰性 |
| 1469 | R8.7.11 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5.0        | R8.7.16 | 陰性 |
| 1470 | R8.7.9  | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5.0        | R8.7.16 | 陰性 |
| 1471 | R8.7.12 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50.0       | R8.7.16 | 陰性 |
| 1472 | R8.7.12 | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 50.0       | R8.7.23 | 陰性 |
| 1473 | R8.7.11 | 熊野町   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 28.0       | R8.7.23 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日    | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|---------|------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1474 | R8.7.13 | 江田島市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 45.0       | R8.7.23 | 陰性 |
| 1475 | R8.7.11 | 世羅町  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40.0       | R8.7.23 | 陰性 |
| 1476 | R8.7.12 | 竹原市  | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 10.0       | R8.7.23 | 陰性 |
| 1477 | R8.7.13 | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 150        | 90.0       | R8.7.23 | 陰性 |
| 1478 | R8.7.13 | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 135        | 80.0       | R8.7.23 | 陰性 |
| 1479 | R8.7.13 | 呉市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 60.0       | R8.7.23 | 陰性 |
| 1480 | R8.7.9  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 35         | 5.0        | R8.7.23 | 陰性 |
| 1481 | R8.7.10 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 12.0       | R8.7.23 | 陰性 |
| 1482 | R8.7.13 | 竹原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 122        | 60.0       | R8.7.23 | 陰性 |
| 1483 | R8.7.16 | 府中市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40.0       | R8.7.23 | 陰性 |
| 1484 | R8.7.14 | 世羅町  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 38.1       | R8.7.23 | 陰性 |
| 1485 | R8.7.16 | 竹原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 20.0       | R8.7.23 | 陰性 |
| 1486 | R8.7.16 | 呉市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40.0       | R8.7.23 | 陰性 |
| 1487 | R8.7.14 | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 108        | 56.0       | R8.7.23 | 陰性 |
| 1488 | R8.7.14 | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 105        | 65.0       | R8.7.23 | 陰性 |
| 1489 | R8.7.16 | 府中市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 40         | 20.0       | R8.7.23 | 陰性 |
| 1490 | R8.7.16 | 府中市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 65         | 40.0       | R8.7.23 | 陰性 |
| 1491 | R8.7.19 | 江田島市 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5.0        | R8.7.23 | 陰性 |
| 1492 | R8.7.20 | 江田島市 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 5.0        | R8.7.23 | 陰性 |
| 1493 | R8.7.17 | 東広島市 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 6.0        | R8.7.23 | 陰性 |
| 1494 | R8.7.17 | 東広島市 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 5.0        | R8.7.23 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日    | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|---------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1495 | R8.7.14 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 30.0       | R8.7.23 | 陰性 |
| 1496 | R8.7.18 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 118        | 60.0       | R8.7.23 | 陰性 |
| 1497 | R8.7.16 | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 30.0       | R8.7.23 | 陰性 |
| 1498 | 7月17日   | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 80         | 20.0       | R8.7.30 | 陰性 |
| 1499 | 7月18日   | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 55.0       | R8.7.30 | 陰性 |
| 1500 | 7月19日   | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 95         | 50.0       | R8.7.30 | 陰性 |
| 1501 | 7月21日   | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 35.0       | R8.7.30 | 陰性 |
| 1502 | 7月18日   | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 104        | 37.5       | R8.7.30 | 陰性 |
| 1503 | 7月20日   | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 104        | 38.5       | R8.7.30 | 陰性 |
| 1504 | 7月19日   | 世羅町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 70.0       | R8.7.30 | 陰性 |
| 1505 | 7月15日   | 三原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 65         | 8.0        | R8.7.30 | 陰性 |
| 1506 | 7月21日   | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 40.0       | R8.7.30 | 陰性 |
| 1507 | 7月19日   | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 35.0       | R8.7.30 | 陰性 |
| 1508 | 7月22日   | 安芸高田市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 50.0       | R8.7.30 | 陰性 |
| 1509 | 7月21日   | 呉市    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60.0       | R8.7.30 | 陰性 |
| 1510 | 7月18日   | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 112        | 70.0       | R8.7.30 | 陰性 |
| 1511 | 7月21日   | 坂町    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 96         | 39.0       | R8.7.30 | 陰性 |
| 1512 | 7月22日   | 世羅町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 41.0       | R8.7.30 | 陰性 |
| 1513 | 7月23日   | 世羅町   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 7.9        | R8.7.30 | 陰性 |
| 1514 | 7月24日   | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 40.0       | R8.8.6  | 陰性 |
| 1515 | 7月25日   | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 15.0       | R8.8.6  | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日  | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|-------|------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1516 | 7月25日 | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 30.0       | R8.8.6  | 陰性 |
| 1517 | 7月27日 | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 20.0       | R8.8.6  | 陰性 |
| 1518 | 7月26日 | 府中市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5.0        | R8.8.6  | 陰性 |
| 1519 | 7月23日 | 北広島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 40.0       | R8.8.6  | 陰性 |
| 1520 | 7月23日 | 世羅町  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 103        | 28.4       | R8.8.6  | 陰性 |
| 1521 | 7月24日 | 世羅町  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 9.9        | R8.8.6  | 陰性 |
| 1522 | 7月24日 | 東広島市 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 30.0       | R8.8.6  | 陰性 |
| 1523 | 7月24日 | 呉市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 50.0       | R8.8.6  | 陰性 |
| 1524 | 7月28日 | 東広島市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 40.0       | R8.8.6  | 陰性 |
| 1525 | 7月28日 | 呉市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 50.0       | R8.8.6  | 陰性 |
| 1526 | 7月24日 | 坂町   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 3.5        | R8.8.6  | 陰性 |
| 1527 | 7月24日 | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 86         | 25.0       | R8.8.6  | 陰性 |
| 1528 | 7月25日 | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 101        | 40.0       | R8.8.6  | 陰性 |
| 1529 | 7月26日 | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 70.0       | R8.8.6  | 陰性 |
| 1530 | 7月30日 | 呉市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 70.0       | R8.8.6  | 陰性 |
| 1531 | 7月29日 | 府中市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 2.0        | R8.8.6  | 陰性 |
| 1532 | 7月29日 | 府中市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 30         | 10.0       | R8.8.6  | 陰性 |
| 1533 | 7月28日 | 熊野町  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 25.0       | R8.8.6  | 陰性 |
| 1534 | 7月29日 | 東広島市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 30.0       | R8.8.6  | 陰性 |
| 1535 | 7月30日 | 広島市  | 雄  | 死亡 | 成獣 | 70         | 不明         | R8.8.6  | 陰性 |
| 1536 | 7月22日 | 竹原市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 15.0       | R8.8.20 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日  | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|-------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1537 | 7月29日 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 80.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1538 | 8月1日  | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 20.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1539 | 8月1日  | 東広島市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 20.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1540 | 7月24日 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 2.0        | R8.8.20 | 陰性 |
| 1541 | 7月27日 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 2.0        | R8.8.20 | 陰性 |
| 1542 | 7月28日 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 65.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1543 | 7月29日 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 2.0        | R8.8.20 | 陰性 |
| 1544 | 8月2日  | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 60.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1545 | 8月2日  | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 80.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1546 | 7月21日 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 30.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1547 | 7月22日 | 竹原市   | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 10.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1548 | 8月2日  | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5.0        | R8.8.20 | 陰性 |
| 1549 | 8月3日  | 廿日市市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 70.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1550 | 8月1日  | 呉市    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 50.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1551 | 8月3日  | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5.0        | R8.8.20 | 陰性 |
| 1552 | 8月1日  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 20.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1553 | 8月4日  | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 10.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1554 | 8月3日  | 府中市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 50.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1555 | 8月2日  | 世羅町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 42.8       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1556 | 8月3日  | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 50.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1557 | 8月4日  | 呉市    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60.0       | R8.8.20 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日  | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|-------|------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1558 | 8月4日  | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 15.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1559 | 8月5日  | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 50.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1560 | 8月4日  | 竹原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 50.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1561 | 8月2日  | 東広島市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 90.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1562 | 8月3日  | 東広島市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 70.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1563 | 8月1日  | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 45.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1564 | 7月31日 | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 95         | 36.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1565 | 8月1日  | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 52         | 3.0        | R8.8.20 | 陰性 |
| 1566 | 8月2日  | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 51         | 3.5        | R8.8.20 | 陰性 |
| 1567 | 8月4日  | 江田島市 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 10.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1568 | 8月4日  | 世羅町  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 45.1       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1569 | 8月6日  | 世羅町  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 65.1       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1570 | 8月5日  | 府中市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 40.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1571 | 8月5日  | 坂町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 101        | 49.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1572 | 8月6日  | 坂町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 59.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1573 | 8月1日  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 40         | 6.0        | R8.8.20 | 陰性 |
| 1574 | 8月1日  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 10.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1575 | 8月1日  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 65         | 15.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1576 | 8月2日  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 75         | 20.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1577 | 8月2日  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 70         | 10.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1578 | 8月3日  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 30.0       | R8.8.20 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日  | 発見場所  | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|-------|-------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1579 | 8月6日  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 25.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1580 | 8月7日  | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 65.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1581 | 8月8日  | 熊野町   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 14.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1582 | 8月9日  | 熊野町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 48.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1583 | 8月9日  | 熊野町   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 45         | 16.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1584 | 8月9日  | 福山市   | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 20.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1585 | 8月7日  | 福山市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 35.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1586 | 8月9日  | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 2.0        | R8.8.20 | 陰性 |
| 1587 | 8月8日  | 呉市    | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1588 | 8月10日 | 安芸高田市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 20.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1589 | 8月12日 | 呉市    | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 70.0       | R8.8.20 | 陰性 |
| 1590 | 8月10日 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 130        | 100.0      | R8.8.27 | 陰性 |
| 1591 | 8月10日 | 竹原市   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 2.0        | R8.8.27 | 陰性 |
| 1592 | 8月12日 | 竹原市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 65.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1593 | 8月7日  | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 50.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1594 | 8月13日 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 20.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1595 | 8月9日  | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 40.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1596 | 8月15日 | 府中市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 30.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1597 | 8月10日 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 60.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1598 | 8月12日 | 江田島市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5.0        | R8.8.27 | 陰性 |
| 1599 | 8月12日 | 江田島市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 5.0        | R8.8.27 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日  | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|-------|------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1600 | 8月17日 | 熊野町  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 18.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1601 | 8月8日  | 世羅町  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 35.1       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1602 | 8月8日  | 世羅町  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 124        | 54.2       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1603 | 8月8日  | 世羅町  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 103        | 36.8       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1604 | 8月10日 | 世羅町  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 101        | 35.2       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1605 | 8月10日 | 世羅町  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 114        | 43.5       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1606 | 8月16日 | 世羅町  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 118        | 51.5       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1607 | 8月17日 | 東広島市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1608 | 8月17日 | 呉市   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 70.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1609 | 8月11日 | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 25.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1610 | 8月14日 | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 50.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1611 | 8月7日  | 坂町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 97         | 40.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1612 | 8月9日  | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 96         | 39.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1613 | 8月12日 | 坂町   | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 62         | 4.0        | R8.8.27 | 陰性 |
| 1614 | 8月18日 | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 25.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1615 | 8月17日 | 呉市   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 40.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1616 | 8月16日 | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 110        | 70.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1617 | 8月18日 | 竹原市  | 不明 | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 20.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1618 | 8月17日 | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 10.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1619 | 8月17日 | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 10.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1620 | 8月18日 | 福山市  | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 55         | 10.0       | R8.8.27 | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日  | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日    | 結果 |
|------|-------|------|----|----|----|------------|------------|---------|----|
| 1621 | 8月18日 | 福山市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 50.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1622 | 8月20日 | 東広島市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 30.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1623 | 8月18日 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1624 | 8月17日 | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 97         | 35.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1625 | 8月20日 | 府中市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 25.0       | R8.8.27 | 陰性 |
| 1626 | 8月22日 | 府中市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40.0       | 9月3日    | 陰性 |
| 1627 | 8月22日 | 府中市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 25.0       | 9月3日    | 陰性 |
| 1628 | 8月23日 | 府中市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 30.0       | 9月3日    | 陰性 |
| 1629 | 8月19日 | 坂町   | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 92         | 30.0       | 9月3日    | 陰性 |
| 1630 | 8月21日 | 廿日市市 | 不明 | 捕獲 | 成獣 | 100        | 30.0       | 9月3日    | 陰性 |
| 1631 | 8月21日 | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 80         | 40.0       | 9月3日    | 陰性 |
| 1632 | 8月24日 | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 70.0       | 9月3日    | 陰性 |
| 1633 | 8月25日 | 府中市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 80         | 20.0       | 9月3日    | 陰性 |
| 1634 | 8月24日 | 北広島町 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 40.0       | 9月3日    | 陰性 |
| 1635 | 8月24日 | 北広島町 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 60         | 25.0       | 9月3日    | 陰性 |
| 1636 | 8月28日 | 世羅町  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 50         | 6.1        | 9月10日   | 陰性 |
| 1637 | 8月30日 | 府中市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 85         | 70.0       | 9月10日   | 陰性 |
| 1638 | 8月28日 | 世羅町  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 85         | 15.8       | 9月10日   | 陰性 |
| 1639 | 9月1日  | 江田島市 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 3.0        | 9月10日   | 陰性 |
| 1640 | 9月1日  | 江田島市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 70         | 30.0       | 9月10日   | 陰性 |
| 1641 | 9月1日  | 江田島市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 80.0       | 9月10日   | 陰性 |

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染状況調査(PCR検査)の結果

| 番号   | 発見月日  | 発見場所 | 性別 | 分類 | 区分 | 体長<br>(cm) | 体重<br>(kg) | 検査月日  | 結果 |
|------|-------|------|----|----|----|------------|------------|-------|----|
| 1642 | 9月2日  | 江田島市 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 10.0       | 9月10日 | 陰性 |
| 1643 | 9月2日  | 江田島市 | 雌  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 10.0       | 9月10日 | 陰性 |
| 1644 | 9月3日  | 江田島市 | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 50         | 5.0        | 9月10日 | 陰性 |
| 1645 | 9月3日  | 江田島市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 50.0       | 9月10日 | 陰性 |
| 1646 | 9月3日  | 府中市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 80.0       | 9月10日 | 陰性 |
| 1647 | 8月31日 | 坂町   | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 97         | 37.0       | 9月10日 | 陰性 |
| 1648 | 9月1日  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 90         | 50.0       | 9月10日 | 陰性 |
| 1649 | 9月1日  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 幼獣 | 60         | 12.0       | 9月10日 | 陰性 |
| 1650 | 9月1日  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40.0       | 9月10日 | 陰性 |
| 1651 | 9月2日  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 45.0       | 9月10日 | 陰性 |
| 1652 | 9月3日  | 三原市  | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 40.0       | 9月10日 | 陰性 |
| 1653 | 9月3日  | 三原市  | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 80.0       | 9月10日 | 陰性 |
| 1654 | 9月5日  | 江田島市 | 雄  | 捕獲 | 成獣 | 120        | 60.0       | 9月10日 | 陰性 |
| 1655 | 9月6日  | 江田島市 | 雌  | 捕獲 | 成獣 | 100        | 45.0       | 9月10日 | 陰性 |