

## 6 干害

表29 干害

発生時生育段階: 発芽期-分けつ初期 適用作物名: 小麦, 裸麦

調査時生育段階: 出穂期前並びに収穫期

(1) 穂高指数, 1/2以下穂数歩合を調査する場合(収穫期)

| $\frac{1}{2}$ 以下穂数歩合(%) |    | 穂高指数(%) |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------|----|---------|----|----|----|----|----|----|
|                         |    | 100     | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| 小<br>麦                  | 0  | 0       | 5  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|                         | 5  | 10      | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|                         | 10 | 20      | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|                         | 15 | 30      | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|                         | 25 | 40      | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 裸<br>麦                  | 0  | 0       | 5  | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 |
|                         | 5  | 5       | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 |
|                         | 10 | 10      | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|                         | 15 | 15      | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|                         | 20 | 20      | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 |

(2) 草丈指数のみ調査する場合(出穂前)

| 草丈指数 | 歩合 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
|------|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| 小    | 麦  | 0   | 10 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 裸    | 麦  | 0   | 10 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 |

対策としては、排水溝を水路として入水するとよい。